

L14 Legemidler i gynekologien

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 10.11.2016
Inger Øverlie

Innhold

| | | | | | |
|-------------|--|------|-----------|---|------|
| L14.1 | Kvinnelige kjønnshormoner | s.1 | L14.2.2.2 | Postkoital antikonsepsjon / Angrepille .. | s.28 |
| L14.1.1 | Østrogener..... | s.1 | L14.2.2.3 | Gestagen livmorinnlegg..... | s.29 |
| L14.1.1.1 | Østradiol | s.3 | L14.2.2.4 | Gestagenimplantat..... | s.30 |
| L14.1.1.2 | Østriol | s.7 | L14.2.2.5 | Gestageninjeksjon..... | s.30 |
| L14.1.2 | Gestagener..... | s.8 | L14.3 | Progesteronreseptormodulerende midler | |
| L14.1.2.1 | Dienogest | s.9 | | | s.31 |
| L14.1.2.2 | Medroksyprogesteron | s.9 | L14.3.1 | Ulipristal | s.31 |
| L14.1.2.3 | Megestrol | s.10 | L14.4 | Gonadotropiner og analoger av | |
| L14.1.2.4 | Noretisteron | s.11 | | gonadotropinfrigjørende hormon | s.31 |
| L14.1.2.5 | Progesteron | s.12 | L14.4.1 | Gonadotropiner | s.31 |
| L14.1.2.6 | Gestagen livmorinnlegg, hormonspiral | s.14 | L14.4.1.1 | Follitropin og urofollitropin | s.31 |
| L14.1.3 | Østrogen–gestagen | s.15 | L14.4.1.2 | Lutropin og koriongonadotropin | s.34 |
| L14.1.3.1 | Østrogen–gestagen, konstant | | L14.4.1.3 | Follitropin og lutropin | s.35 |
| | hormoninnhold | s.15 | L14.4.1.4 | Menotropin | s.36 |
| L14.1.3.1.1 | Østradiol–medroksyprogesteron | s.15 | L14.4.1.5 | Korifollitropin alfa | s.37 |
| L14.1.3.1.2 | Østradiol–noretisteron | s.16 | L14.4.2 | Analoger av gonadotropinfrigjørende | |
| L14.1.3.2 | Østrogen–gestagen, variabelt | | | hormon..... | s.38 |
| | hormoninnhold..... | s.17 | L14.4.2.1 | Buserelin | s.39 |
| L14.1.3.2.1 | Østradiol–noretisteron | s.17 | L14.4.2.2 | Goserelin | s.39 |
| L14.1.4 | Tibolon | s.18 | L14.4.2.3 | Leuprorelin | s.40 |
| L14.2 | Antikonsepsjonsmidler | s.19 | L14.4.2.4 | Nafarelin | s.42 |
| L14.2.1 | Østrogen–gestagen (kombinasjons p- | | L14.4.2.5 | Triptorelin | s.42 |
| | midler)..... | s.19 | L14.4.2.6 | Cetrorelix | s.43 |
| L14.2.1.1 | Monofasepreparater; p-piller, p-vaginalring, | | L14.4.2.7 | Ganirelix | s.44 |
| | p-plaster | s.21 | L14.5 | Hemmer av gonadotropinfrigjøring | s.45 |
| L14.2.1.2 | Sekvenspreparater; p-piller | s.25 | L14.5.1 | Danazol | s.45 |
| L14.2.2 | Gestagen (antikonsepsjon)..... | s.26 | L14.6 | Kilder, legemidler i gynekologien..... | s.46 |
| L14.2.2.1 | Perorale gestagener | s.27 | | | |

Antiøstrogenener og østrogenreseptormodulerende midler, se

- [Antiøstrogenener og østrogenreseptormodulerende midler \(L3.11\)](#)
- [Klomifen \(L3.11.1\)](#)

L14.1. Kvinnelige kjønnshormoner

Publisert: 13.09.2016

Se også

[Antikonsepsjonsmidler](#)

L14.1.1. Østrogenener

Publisert: 13.09.2016

Egenskaper

Østrogenene er nødvendige for normal utvikling og funksjon av kvinnelige kjønnsorganer og mammae, og for utvikling og opprettholdelse av sekundære kjønnskaraktistika, som kroppsfigur, fettvev, hud, osv. Noen effekter av særlig klinisk og farmakologisk betydning er disse:

- Østrogenener stimulerer proliferasjon av endometriet. Denne effekten motvirkes av gestagener. Østrogenener stimulerer også vekst av mammaepitel, særlig ductepitelet, og samvirker med gestagener og andre hormoner i utviklingen av den funksjonelt modne mammakjertelen.
- Knokkelvekst fremmes av østrogenener, men samtidig fremskyndes epifyseskivene's tillukking. Østrogenene opprettholder knokkelvevets struktur og masse, bl.a. ved å redusere osteoklastenes beinresorpsjon.
- Østrogenener påvirker hjerte- og karsystemet på flere måter. De virker direkte på karene og reduserer vaskulær tonus. Østrogenener gir en lett heving av HDL-kolesterol og triglyserid, men senkning av LDL-

kolesterol. De medfører økt trombosetendens som en nettoeffekt av ulike virkninger på flere faktorer i regulering av koagulasjon og fibrinolyse.

- Den ovulasjonshemmende virkningen (via hemning av gonadotropinfrigjøring fra hypofysen) er noe svakere for østrogenerne enn for gestagenene, men de virker i effektiv synergisme.

Preparatene: De østrogen virkende legemidler som er i bruk hos oss i dag, er de naturlige hormonene *østradiol* og *østriol*, eller det syntetisk modifiserte *etinyløstradiol*. Østradiol er det viktigste fysiologiske østrogener hos kvinner i fertil alder. Det metaboliseres delvis til østron og østriol. Postklimakterisk opphører ovarienes produksjon av østradiol. Østrogen produseres da fortsatt i form av østron i bl.a. perifert fettvev (ved omdannelse av androgen produsert i binyrebark eller ovariestroma). Østriol er mindre potent enn østradiol. Alle disse hormonene nedbrytes raskt, særlig etter peroralt inntak, pga. uttalt førstestapasjemetabolisme i lever. Etinyløstradiol inaktiveres mye langsommere enn østradiol, og ekvipotente doser av etinyløstradiol er derfor betydelig lavere enn av østradiol.

I substitusjonsbehandling ved ovariesvikt brukes østradiol, mens etinyløstradiol hovedsakelig brukes i p-piller.

Indikasjoner

Se enkeltomtalene nedenfor.

Bivirkninger

- Mange har ingen bivirkninger av østrogen i de doser som anvendes ved postklimakteriell hormonterapi.
- *Vanlige:* Mastalgi, væskeretensjon, kvalme.
- *Hjerte- og karsykdom:* Peroral behandling med østrogener, med eller uten gestagen, øker risikoen for venøs tromboemboli 2–3 ganger. Risikoen er størst det første året. Nyere studier viser at tidspunktet for oppstart av østrogener, med eller uten gestagener, kan ha betydning for eventuell utvikling av hjerte- og karsykdom. Oppstart av substitusjonsbehandling omkring menopause, eller før 60 års alder, synes å ha en beskyttende effekt på det kardiovaskulære systemet og inkluderer positiv effekt på kardiovaskulære risikofaktorer (lipidprofil, insulinsensitivitet) og vaskulært endotel (inklusive NO-produksjon) endotel celleregenerering, iskemiforandringer, karkonstriksjon, apoptose og plateaggregering. Ifølge teorien om de fire stadier av endotelskade (Harman) (endotelskade, plakkdannelse, inflammasjon og plakk, ruptur og trombose) synes det som om østrogenbehandling har en positiv effekt under de to første stadiene (tidlig atherogenese), men en motsatt effekt under tredje og fjerde stadiet. (The timing hypothesis). Sammenlignet med oral administrasjon gir transdermal tilførsel av østradiol et mer konstant nivå av østradiol, tilnærmet 1:1 østradiol:østron, hvilket er tilnærmet fysiologisk nivå. Dette reduserer leverens første-passasje-effekt og reduserer bl.a. tromboserisikoen.
- *Kreft:* Østrogenbehandling uten tilskudd av gestagen gir endometriehyperplasi og øker markert risikoen for endometriekreft. Denne risikoøkningen er avhengig av dose og behandlingsvarighet og reduseres ikke ved pauser i østrogenbehandlingen. Tillegg av gestagen beskytter mot østrogeninduserte endometrieforandringer. Østrogen, spesielt i kombinasjon med gestagen, øker risikoen for utvikling av cancer mammae. Risikoen tiltar med varigheten av behandlingen. Gjennomsnittlig risikoøkning ved fem års bruk er trolig over 50 %. Den økte risikoen er til stede hovedsakelig i den perioden kvinnen bruker østrogen og avtar etter seponering. Etter fem år har de kvinnene som tidligere har brukt østrogen, ikke lenger høyere risiko for brystkreft enn andre i samme alder. Østrogen-gestagenbehandling ser ut til å redusere risikoen for tykktarmskreft, kanskje med så mye som 40 %.
- *Andre:* Migrene kan forverres eller utløses ved eksogen østrogentilførsel (men kan også bedres). Spesielt peroral østrogenbehandling kan påvirke leverfunksjonen og øke risiko for galleveissykdom.

Graviditet, amming

Graviditet: Misdannelser er beskrevet hos barn av kvinner som har vært behandlet med kjønnshormoner under graviditet, men årsakssammenhengen er usikker. Den samlede erfaring ved utilsiktet bruk tidlig i svangerskapet har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt av dagens p-piller. *Amming:* Melkeproduksjonen kan hemmes av høye østrogendoser. Redusert melkemengde er rapportert hos ammende. Mulig reduksjon av nitrogen- og proteininnhold i morsmelken. Sjeldne tilfeller av brystforstørrelse hos barnet er rapportert.

Forsiktighetsregler

Disposisjon for venøs tromboembolisme. Risiko for arteriell blodpropp, spesielt hos røykere. Pasienter med gjennomgått ovarialkreft eller cervixkreft kan få østrogener. Migrene kan forverres. Myoma uteri kan vokse. Endometriose kan forverres.

Kontraindikasjoner

Østrogenfølsom kreft. Gjennomgått endometriekreft er en relativ kontraindikasjon. Venøs tromboembolisk sykdom eller arvelig disposisjon for blodpropp. Alvorlige leverfunksjonsforstyrrelser. Udiagnostisert vaginalblødning.

Kontroll

Ved behandling med østrogen systemisk, må risikofaktorer (f.eks. arvet disposisjon for blodpropp) avklares, blodtrykk måles, mammae undersøkes og gynekologisk undersøkelse utføres. Mammografi kan med fordel utføres før behandlingen, da undersøkelsen er enklere hvis brystet ikke er hormonstimulert. Kontroll etter tre måneder kan være hensiktsmessig, senere med ett til to års intervaller. Mammografi følger vanlige screeningrutiner. Uventede underlivsblødninger må utredes.

L14.1.1.1. Østradiol

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 04.06.2018

Se også

Vedrørende **graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner** og **kontroll**, se [Østrogener](#)

Egenskaper

Naturlig østrogen.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er god ved peroral, transkutan og vaginal tilførsel. Data for biotilgjengelighet savnes. Peroralt tilført østradiol er gjenstand for uttalt førstepassasjemetabolisme i leveren. Lite aktive metabolitter. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er ca. 1 time.

Indikasjoner

- *Systemisk bruk:* Behandling av hetetokter og svettebyger hos kvinner med østrogenmangel. Forebygging av osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fremtidige brudd dersom hun ikke tåler, eller har kontraindikasjoner mot andre legemidler godkjent for å forebygge osteoporose. For indikasjonstilling se [Osteoporose \(T17.2\)](#). Kvinner med bevart uterus skal også ha gestagen eller følges nøye mht. ev. endometriehyperplasi (ultralyd og endometriediagnostikk).
- *Vaginaltabletter:* Behandling av urogenitale plager som kan relateres til østrogenmangel.

Dosering og administrasjon

- *Systemisk behandling:*
 - Peroralt: 1 (ev. 2) mg daglig
 - Depotplaster: 25–50 µg/24 timer. Ved behov for høyere dosering: 75 eller 100 µg/24 timer
 - Transdermalspray: 1 spraydose 1,53 mg på tørr og frisk hud på underarmen 1 gang daglig. Kan økes til 2, maksimalt 3 spraydoser daglig.
- *Lokalbehandling* (for urogenital slimhinneatrofi):
 - Vagitorier eller vaginaltabletter: En vagitorie / en vaginaltablett to ganger i uken. Rutinen med å gi daglige applikasjoner i de første ukene kan medføre generelle bivirkninger som mastalgi
 - Ved lokalbehandling med østrogen er det ikke nødvendig med gestagentilskudd

Overdosering

Se [Ø \(G12.5.28\)](#).

Bivirkninger

Vanligste bivirkninger er blødninger, mastalgi, kvalme, oppblåsthet og hodepine.

Kontroll, oppfølging

Det kan være hensiktsmessig med kontroll tre måneder etter oppstart av behandling for å diskutere kvinnens oppfatning av behandlingen og ev. foreta justeringer. Instruksjon om selvundersøkelse av brystene og mammografi hvert annet år.

Informasjon til pasient

Behandlingen bør vurderes regelmessig. Seponering kan forsøkes, men ca. halvparten får symptomer tilbake uansett alder eller varighet av hormonbehandling. Lokalbehandling kan være livslang.

Delestrogen Par Pharmaceutical

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|-------------------|------|-------|------|------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Østradiol: 10 mg | 5 ml | C | | – |

Depo -Estradiol Pharmacia & Upjohn

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|-------------------|------|-------|------|------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Østradiol: 5 mg | 5 ml | C | | – |

Dermestril BGP Products

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|----------------------|-------|-------|------|------|
| Depotplaster | Østradiol: 25 mikrog | 8 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog | 8 stk | C | | – |

Divigel Orion

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|------|-------------------|--------|-------|------|------|
| Gel | Østradiol: 1 mg | 91 stk | C | | – |

Estradiol Hexal Hexal A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|------------------------|--------|-------|------|--------|
| Depotplaster | Østradiol: 25 mikrog | 24 stk | C | b | 494,- |
| Depotplaster | Østradiol: 37.5 mikrog | 24 stk | C | b | 536,20 |
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog | 24 stk | C | b | 544,20 |
| Depotplaster | Østradiol: 75 mikrog | 24 stk | C | b | 623,90 |
| Depotplaster | Østradiol: 100 mikrog | 24 stk | C | b | 671,10 |

Estradiol Transderm System sandoz Sandoz

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|------------------------|-------|-------|------|------|
| Depotplaster | Østradiol: 37.5 mikrog | 8 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog | 8 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 75 mikrog | 8 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 100 mikrog | 8 stk | C | | – |

Vivelle dot Sandoz

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|----------------------|---------|-------|------|------|
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog | 8x1 stk | C | | – |

Estradiol valerate xiromed Xiromed

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|-------------------|------|-------|------|------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Østradiol: 10 mg | 5 ml | C | | – |

Estradot Sandoz A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|------------------------|----------|-------|------|--------|
| Depotplaster | Østradiol: 25 mikrog | 24x1 stk | C | b | 494,- |
| Depotplaster | Østradiol: 37.5 mikrog | 24x1 stk | C | b | 536,20 |
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog | 24x1 stk | C | b | 544,20 |
| Depotplaster | Østradiol: 75 mikrog | 24x1 stk | C | b | 623,90 |
| Depotplaster | Østradiol: 100 mikrog | 24x1 stk | C | b | 671,10 |

Estramon Hexal AG

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|------------------------|--------|-------|------|------|
| Depotplaster | Østradiol: 25 mikrog | 24 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 37.5 mikrog | 24 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog | 24 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 75 mikrog | 24 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 100 mikrog | 24 stk | C | | – |

Estring Pfizer

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------|-------------------|-------|-------|------|------|
| Vaginalinnlegg | Østradiol: 2 mg | 1 stk | C | | – |

Estring Paranova Danmark

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------|-----------------------|-------|-------|------|------|
| Vaginalinnlegg | Østradiol: 7.5 mikrog | 1 stk | C | | – |

Estrofem Novo Nordisk

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|-------|------|------|
| Tablett | Østradiol: 2 mg | 3x28 stk | C | | – |

Estrofem Novo Nordisk A/S (2)

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|--------|-------|------|------|
| Tablett | Østradiol: 2 mg | 28 stk | C | | – |

Estrogel Takeda

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|------|-------------------|----------|-------|------|------|
| Gel | Østradiol: 0.6 mg | 64 doser | C | | – |

Estrogel Besins Healthcare SA

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------|--------------------|------|-------|------|--------|
| Transdermalgel | Østradiol: 0.75 mg | 80 g | C | b | 147,30 |

Lenzetto Gedeon Richter Plc

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|------------------------------|--------------------|------------|-------|------|--------|
| Transdermalspray, oppløsning | Østradiol: 1.53 mg | 3×56 doser | C | b | 378,50 |
| Transdermalspray, oppløsning | Østradiol: 1.53 mg | 56 doser | C | b | 150,30 |

Lenzetto Gedeon Richter

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|------------------------------|--------------------|------------|-------|------|------|
| Transdermalspray, oppløsning | Østradiol: 1.53 mg | 3×56 doser | C | | – |
| Transdermalspray, oppløsning | Østradiol: 1.53 mg | 56 doser | C | | – |

Progynova Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Østradiol: 1 mg | 3×28 stk | C | b | 96,90 |
| Tablett | Østradiol: 2 mg | 3×28 stk | C | b | 122,90 |

Progynova Bayer

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|-------|------|------|
| Tablett | Østradiol: 1 mg | 3×21 stk | C | | – |

Progynova 21 Jenapharm

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|-------|------|------|
| Tablett | Østradiol: 2 mg | 3×21 stk | C | | – |

Vagidonna Sandoz - København

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------|----------------------|--------|-------|------|--------|
| Vaginaltablett | Østradiol: 10 mikrog | 24 stk | C | | 222,20 |

Vagifem Novo Nordisk A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------|----------------------|--------|-------|------|--------|
| Vaginaltablett | Østradiol: 10 mikrog | 24 stk | C | | 222,20 |

Vagifem Novo Nordisk A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------|----------------------|--------|-------|------|------|
| Vaginaltablett | Østradiol: 10 mikrog | 18 stk | F | | – |

Vivelle dot Novartis

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|----------------------|---------|-------|------|------|
| Depotplaster | Østradiol: 75 mikrog | 8×1 stk | C | | – |

L14.1.1.2. Østriol

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 19.06.2018

Se også

Vedrørende **graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Østrogener](#)

Egenskaper

Naturlig østrogen, mindre potent enn østradiol. Ved vaginal tilførsel oppnås normalisering av det urogenitale epitelet.

Farmakokinetikk

God absorpsjon ved både peroral og vaginal tilførsel. Metaboliseres nesten fullstendig i leveren ved konjugering. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Data for halveringstiden savnes.

Indikasjoner

Urogenital slimhinneatrofi som skyldes østrogenmangel. Profylakse ved kronisk residiverende cystouretritter ved østrogenmangel. Forsøksvis ved visse former for urininkontinens.

Dosering og administrasjon

- *Peroralt:* 1–2 mg daglig
- *Vaginalt:* En vagitorie, en applikator vaginalkrem (0,5 mg) eller en applikator vaginalgel (50 µg) 2 ganger ukentlig

Rutinen med å gi daglige applikasjoner i de første ukene kan medføre systemisk opptak og gi bivirkninger som mastalgi. Lokalbehandling med østriol foretrekkes fremfor peroral behandling.

Overdosering

Se [Ø \(G12.5.28\)](#).

Gelisse Italfarmaco S.A.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|------------|--------------------|------|-------|------|--------|
| Vaginalgel | Østriol: 50 mikrog | 30 g | C | | 272,60 |

Ovesterin Aspen Pharma Trading Limited

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-------------|-------------------|--------|-------|------|--------|
| Tablett | Østriol: 1 mg | 90 stk | C | | 190,40 |
| Tablett | Østriol: 2 mg | 90 stk | C | | 267,60 |
| Vaginalkrem | Østriol: 0.1 % | 15 g | F | | – |
| Vagitorie | Østriol: 0.5 mg | 15 stk | F | | – |

L14.1.2. Gestagener

Publisert: 13.09.2016

Se også

[Gestagen \(antikonsepsjon\)](#)

Egenskaper

Gestagener har mange effekter. De hemmer østrogenindusert proliferasjon av endometriet og utvikler et sekretorisk eller pseudosekretorisk endometrium etter forutgående adekvat østrogenstimulering. Effekten på endometriet kan også være pseudodecidualisering eller atrofi. Ved seponering fremkalles blødning i et sekretorisk endometrium. Gestagener motvirker østrogenets effekt på cervixsekretet. Det stimulerer utvikling/modning av østrogeninitierte mammakjertler. Frigjøring av GnRH (gonadotropinfrigjørende hormon) og gonadotropiner reduseres og derved hemmes oocytmodning og ovulasjon. Flere ulike gestagener brukes som legemidler, alene eller i kombinasjon med østrogen. En hovedgruppe er progesteronanaloger, som har relativt selektiv virkning på progesteronreseptorene, men som også kan ha svake virkninger over både androgen- og glukokortikoidreseptorer. Aktuelle stoffer er medroksyprogesteron og megestrol. Den andre hovedgruppen, (19-nor-)testosteronanaloger, har varierende spesifisitet og virkningsprofil, med bl.a. androgen, østrogen eller antiøstrogen effektkomponent. Mange av gestagenene i denne gruppen, som norgestrel, levonorgestrel og noretisteron, har en signifikant androgen virkning, mens andre, som desogestrel, er helt fri for androgen effekt. Cyproteron er et progesteronderivat med kombinert antiandrogen/gestagen effekt, se [Cyproteron \(L3.10.2.1\)](#). Drospirenon har i tillegg til gestagenvirkning også antimineralkortikoid effekt. Det er ikke påvist økt tromboserisiko ved bruk av gestagen.

Indikasjoner

Indikasjonsområdene varierer for de ulike preparatene.

- Metroragi som antas å skyldes inadekvat corpus luteumfunksjon (anovulasjon)
- Endometriose
- Klimakterielle plager (gestagen i kombinasjon med østrogen)
- Antikonsepsjon (se [Antikonsepsjonsmidler](#))
- Forskyvning av menstruasjon (gestagen eller kombinasjons p-pille)
- Gestagentest som ledd i utredning av amenoré
- Cancer corporis uteri, ved inoperabel primærtumor og ved residiv etter kirurgi
- Cancer mammae, som andre- eller tredjelinjes endokrin terapi ved metastaserende tumor

Ved kreft brukes enten megestrol eller medroksyprogesteron (peroralt eller intramuskulær injeksjon).

Overdosering

Se [P \(G12.5.16\)](#).

Bivirkninger

Væskeretensjon, blødningsforstyrrelser, amenoré, mastalgi, tretthet, libidoendringer, kvalme, hodepine, gastrointestinale plager, urtikaria. Noen av forbindelsene (levonorgestrel, noretisteron) kan gi androgene bivirkninger som akne, og ved høye doser hirsutisme og alopeci. Injeksjonsbehandling kan redusere beinmassen. Høydosebehandling medfører en del andre bivirkninger enn de som sees ved de lavere doser som brukes ved andre indikasjoner. Hyppigst er kvalme og vektøkning. Andre komplikasjoner er hypertensjon, ikterus, tremor. I høye doser kan androgen virkning bli signifikant også for androgensvake gestagener. Glukokortikoidkomponent kan virke diabetogent og i sjeldne tilfeller gi Cushingpreg.

Graviditet, amming

Graviditet: Enkelte gestagener (noretisteron) har vært assosiert med virilisering av genitalia hos jentefostre, spesielt ved bruk av høye doser. Hypospadi har også vært rapportert, men årsakssammenhengen er usikker. Det er ingen holdepunkter for at gestagener i de doser som inngår i hormonelle antikonsepsjonsmidler medfører risiko for skadelige effekter. *Amming:* Gestagener i høye doser kan hemme melkeproduksjonen. Tilbakeholdenhet med amming ved høydosebehandling av kreft.

Forsiktighetsregler

Nedsatt leverfunksjon. Hypertoni. Arteriell karsykdom.

Kontraindikasjoner

Aktiv leversykdom. Betydelig nedsatt leverfunksjon. Levertumores. Udiagnostiserte vaginalblødninger.

L14.1.2.1. Dienogest

Publisert: 13.09.2016

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner**, se [Gestagener](#)

Egenskaper

Nortestosteronderivat uten androgen virkning, men med antiandrogen aktivitet som svarer til en tredel av cyproteronets effekt.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 91 %. Metaboliseres i leveren via CYP3A4. Halveringstid er ca. 9–10 timer. Utskilles via nyrene og i feces.

Indikasjoner

Endometriose

Dosering og administrasjon

2 mg daglig uten pause. Enhver hormonell prevensjon må seponeres først (ikke-hormonelle prevensjonsmetoder benyttes). Ingen erfaring med behandling utover 15 måneder.

Informasjon til pasienten

Seponere ev. hormonell prevensjon.

Dienogest Besins Laboratoires Besins International S.A.S.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|--------|-------|------|---------|
| Tablett | Dienogest: 2 mg | 84 stk | C | | 1 264,- |

Visanne Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|--------|-------|------|---------|
| Tablett | Dienogest: 2 mg | 84 stk | C | | 1 264,- |

Visanne 2care4 ApS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|--------|-------|------|---------|
| Tablett | Dienogest: 2 mg | 84 stk | C | | 1 264,- |

Visanne Abacus Medicine A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|--------|-------|------|---------|
| Tablett | Dienogest: 2 mg | 84 stk | C | | 1 264,- |

L14.1.2.2. Medroksyprogesteron

Publisert: 13.09.2016

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner**, se [Gestagener](#)

Egenskaper

Progesteronderivat. Har i lave doser bare minimal androgen effekt, men kan i høye doser ha signifikant androgen og glukokortikoid virkning.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er lav og variabel, 0,6–10 %, ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren via CYP3A4. Metabolittenes aktivitet er ikke klarlagt. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er ca. 15 timer for tabletter, 40 døgn ved depotinjeksjon.

Indikasjoner

- Metroragi som antas å skyldes inadekvat corpus luteumfunksjon
- I kombinasjon med østrogen ved klimakterielle plager
- Som palliativ behandling av endometriose
- Cancer corporis uteri og metastaserende cancer mammae
- Antikonsepsjon, se [Antikonsepsjonsmidler](#)
- Gestagentest ved utredning av sekundær amenoré (hvor bortfallsblødning etter seponering indikerer at det foreligger endogen østrogenproduksjon som har påvirket endometriet)

Dosering og administrasjon

- *Metroragi* som antas å skyldes inadekvat corpus luteumfunksjon: 5–10 mg daglig i 12–14 dager. Seponeringsblødning følger vanligvis etter 3–4 dager. Ny kur fra ca. 15. dag i syklus. Behandlingen har tradisjonelt vært gitt i tre sykler, men kan hos kvinner nær forventet menopause fortsette til det ikke kommer seponeringsblødning som tegn på at østrogenproduksjonen er opphørt.
- *Klimakteriske plager*: Tillegg til østrogenbehandling; 5–10 mg daglig sammen med østrogen de siste 12–14 dager av syklus. Langsyklisk behandling: 20 mg daglig i 14 dager hver 3. måned kan forsøkes under nøye overvåking av effekt på endometriet.
- *Endometriose*: 10–30 mg × 3 daglig eller injeksjon (med depoteffekt) 150 mg hver 2.–4. uke, ev. lengre intervaller ved effekt (på symptomer og ved amenoré).
- *Cancer corporis uteri*: Tabletter: 200–400 mg daglig eller injeksjon (depot) 1000 mg ukentlig inntil bedring, senere 500 mg ukentlig.
- *Metastaserende cancer mammae*: Tabletter: 100–400 mg eller mer daglig, fordelt på to eller flere doser, eller injeksjon (med depoteffekt): 500 mg/dag i 28 dager, senere 500 mg to ganger ukentlig.
- Antikonsepsjon: se [Gestageninjeksjon](#).
- Gestagentest: 10 mg daglig i 5 dager.

Overdosering

Se [M \(G12.5.13\)](#).

Depo-Provera Pfizer AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|-----------------------------|------|-------|------|--------|
| Injeksjonsvæske, suspensjon | Medroksyprogesteron: 150 mg | 1 ml | C | b | 105,80 |

Provera Pfizer AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|----------------------------|--------|-------|------|--------|
| Tablett | Medroksyprogesteron: 10 mg | 40 stk | C | b | 126,30 |

Provera Pfizer

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|----------------------------|--------|-------|------|------|
| Tablett | Medroksyprogesteron: 5 mg | 30 stk | C | | – |
| Tablett | Medroksyprogesteron: 10 mg | 10 stk | C | | – |

L14.1.2.3. Megestrol

Publisert: 13.09.2016

Se også

Vedrørende bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se [Gestagener](#)

Egenskaper

Progesteronanalogue. Relativt liten androgen effekt, men ved bruk av de høye dosene som er aktuelle, har megestrol både androgen og glukokortikoid virkning.

Farmakokinetikk

Data for biotilgjengelighet savnes. Metaboliseres bare i liten grad i leveren. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er varierende fra 13–105 timer.

Indikasjon

Metastaserende cancer mammae når primær endokrin terapi har sviktet.

Dosering og administrasjon

160 mg daglig.

Overdosering

Se [M \(G12.5.13\)](#).

Megace Bausch Health Ireland Limited

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|--------|-------|------|--------|
| Tablett | Megestrol: 160 mg | 30 stk | C | b | 396,80 |

Megace Bausch Health Companies Inc.

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|--------|-------|------|------|
| Tablett | Megestrol: 160 mg | 30 stk | C | | – |

L14.1.2.4. Noretisteron

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 20.12.2017

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner**, se [Gestagener](#)

Egenskaper

Gestagen.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 65 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert, men også noe i feces. Halveringstiden er tofasisk: Initialt 1–2 timer, deretter terminalt 5–13 timer.

Indikasjoner

Utsettelse av menstruasjon. Behandling av akutt metroragi ved anovulasjon (progesteronsvikt).

Dosering og administrasjon

- *Menstruasjonsforskyvning*: 5 mg × 3 som startes senest tre dager før ventet menstruasjon (for sikrest effekt syv dager før ventet menstruasjon). Seponeringsblødning kommer etter 2–3 dager. Man har ikke dokumentasjon for utsettelse i mer enn 10–14 dager. Graviditet bør være utelukket.
- *Behandling av akutt anovulatorisk blødning*: 5 mg x 2 i en uke, deretter 5 mg daglig i to uker.
- *Gestagentilskudd ved østrogenbehandling*: 5 mg daglig er unødvendig høy dose for endometriebeskyttelse og lavere dose er ikke tilgjengelig på markedet.

Obs. Anbefalingene avviker noe fra gjeldende SPC.

Forsiktighetsregler

Det er usikkert om noretisteron er risikofritt å bruke av kvinner med øket tromboserisiko da det delvis nedbrytes til etinyløstradiol. Se ref. [Kvinnelige kjønnshormoner/ Noretisteron](#).

Kilder[Kvinnelige kjønnshormoner/ Noretisteron](#)**Primolut N** Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|--------------------|--------|-------|------|-------|
| Tablett | Noretisteron: 5 mg | 30 stk | C | b | 68,50 |

L14.1.2.5. Progesteron

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 11.01.2018

Se også

Vedrørende **graviditet og amming**, se [Gestagener](#)

Egenskaper

Vaginalgel og vaginaltabletter som inneholder mikronisert progesteron. Virker som endogent progesteron. I nærvær av tilstrekkelig østrogen forvandler progesteron et proliferativt endometrium til et sekretorisk endometrium. Progesteron er nødvendig for å øke endometriets reseptivitet for implantasjon av embryo. Progesteron bidrar også til å opprettholde graviditeten.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 20 % ved vaginal tilførsel. Metaboliseres i leveren, delvis til aktiv metabolitt. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles hovedsakelig som metabolitter via nyrene og gallen, i mindre grad uendret via gallen.

Hemmere av CYP450-3A4 kan redusere eliminasjonshastigheten og derved øke biotilgjengeligheten av progesteron.

Indikasjoner

Del av behandlingsopplegg ved assistert befruktning for å understøtte lutealfasen.

Kan også anvendes ved sekundær amenoré i kombinasjon med østrogenterapi (Crinone)

Dosering og administrasjon

Appliseres vaginalt. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se [P \(G12.5.16\)](#).

Bivirkninger

Vanlige: ømme bryster, abdominale smerter, uterine spasmer, kvalme, tretthet, somnolens, hodepine.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke brukt samtidig med andre vaginale preparater.

Forsiktighet hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.

Fare for legemiddelinteraksjoner, se [Legemiddelverkets interaksjonssøk](#).

Kontraindikasjoner

Udiagnostisert vaginalblødning. Kjent "missed abortion" eller ektopisk graviditet. Alvorlig redusert leverfunksjon. Kjent eller mistenkt kreft i bryster eller genitalier. Aktiv arteriell eller venøs tromboembolisme eller alvorlig tromboflebit. Porfyri.

Kontroll og oppfølging

Pga. mulig væskeretensjon krever tilstander som f.eks. epilepsi, migrene, astma, nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon nøye monitorering.

Crinone Merck AB

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|------------|-------------------|------------|-------|------|--------|
| Vaginalgel | Progesteron: 8 % | 15×1.125 g | C | | 613,60 |

Crinone 2care4 ApS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|------------|-------------------|------------|-------|------|--------|
| Vaginalgel | Progesteron: 8 % | 15×1.125 g | C | | 613,60 |

Cyclogest 2care4 ApS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------|---------------------|--------|-------|------|--------|
| Vagitorie | Progesteron: 400 mg | 15 stk | C | | 220,30 |

Cyclogest Gedeon Richter Plc.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------|---------------------|--------|-------|------|--------|
| Vagitorie | Progesteron: 400 mg | 15 stk | C | | 220,30 |

Gepretix Exeltis Healthcare S.L. (1)

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-------------|---------------------|--------|-------|------|--------|
| Kapsel, myk | Progesteron: 100 mg | 30 stk | C | | 167,80 |
| Kapsel, myk | Progesteron: 200 mg | 15 stk | C | | 170,10 |

Lutinus Ferring

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------|---------------------|--------|-------|------|------|
| Vaginaltablett | Progesteron: 100 mg | 21 stk | C | | – |

Lutinus Ferring Legemidler AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------|---------------------|--------|-------|------|--------|
| Vaginaltablett | Progesteron: 100 mg | 21 stk | C | | 333,30 |

Progestan Besins Healthcare

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------------|---------------------|--------|-------|------|------|
| Vaginalkapsel, myk | Progesteron: 100 mg | 30 stk | C | | – |

Utrogestan Besins Healthcare

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-------------|---------------------|--------|-------|------|------|
| Kapsel, myk | Progesteron: 100 mg | 90 stk | C | | – |

Progesteron SA Sykehusapoteket Oslo, Ullevål

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|------|--------------------|-------|-------|------|------|
| Krem | Progesteron: 1.7 % | 100 g | C | | – |
| Krem | Progesteron: 1.7 % | 50 g | C | | – |

Prolutex

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-------|------|------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Progesteron: 25 mg | 7 x 25 mg | C | | – |

Prolutex IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|--------------------|------------|-------|------|----------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Progesteron: 25 mg | 14 x 25 mg | C | | 1 057,90 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Progesteron: 25 mg | 7 x 25 mg | C | | 547,10 |

Utrogest Kade/Besins

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-------------|---------------------|--------|-------|------|------|
| Kapsel, myk | Progesteron: 100 mg | 30 stk | C | | – |

Utrogest Dr. Kade / Besins Pharma

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-------------|---------------------|--------|-------|------|------|
| Kapsel, myk | Progesteron: 100 mg | 90 stk | C | | – |

Utrogestan Besins Healthcare Ireland Limited

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------------|---------------------|--------|-------|------|--------|
| Kapsel, myk | Progesteron: 100 mg | 90 stk | C | | 267,70 |
| Kapsel, myk | Progesteron: 100 mg | 30 stk | C | | 113,40 |
| Kapsel, myk | Progesteron: 200 mg | 45 stk | C | | 293,20 |
| Vaginalkapsel, myk | Progesteron: 200 mg | 15 stk | C | b | 141,- |
| Vaginalkapsel, myk | Progesteron: 400 mg | 15 stk | C | | 259,50 |

Utrogestan Besins Healthcare SA - Pharmacovigilance

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-------------|---------------------|--------|-------|------|------|
| Kapsel, myk | Progesteron: 100 mg | 30 stk | C | | – |

Utrogestan Besins Healthcare Ireland Limited (1)

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------------|---------------------|--------|-------|------|--------|
| Vaginalkapsel, myk | Progesteron: 300 mg | 15 stk | C | | 203,70 |

L14.1.2.6. Gestagen livmorinnlegg, hormonspiral

Publisert: 13.09.2016

Se ogsåFor mer informasjon, se [Gestagen livmorinnlegg](#)

Egenskaper

Virker antiproliferativt på endometriet.

Indikasjoner

Menoragi. Antikonsepsjon.

Dosering og administrasjon

Se [Dosering og administrasjon](#).

L14.1.3. Østrogen–gestagen

Publisert: 13.09.2016

Se også

For mer informasjon, se også [Østrogener](#) og [Gestagener](#)

Egenskaper

Preparater som inneholder både østrogen og gestagen i fast, kontinuerlig kombinasjon eller gestagen i bare en del av syklus. Med kontinuerlig gestagentilførsel blir endometriet etter langvarig bruk atrofisk, og vaginalblødninger vil da utebli. Uregelmessige vaginalblødninger er likevel en ikke uvanlig bivirkning, spesielt i de første måneder. Kontinuerlig gestagentilførsel oppnås enten med tabletter eller med et gestagenholdig livmorinnlegg.

Sekvenspreparater bygger opp et proliferativt endometrium i første del av syklus hvor det bare tilføres østrogen, og gir sekretoriske forandringer i andre del av syklus hvor det gis kombinasjon av østrogen og gestagen. Ved seponering av gestagen etter 10–14 dager kommer en vaginalblødning.

Farmakokinetikk

- *Østradiol*: Se [Farmakokinetikk](#)
- *Medroksyprogesteron*: Se [Farmakokinetikk](#)
- *Noretisteron*: Se [Farmakokinetikk](#)
- *Levonorgestrel*: Biotilgjengeligheten er 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren ved reduksjon, hydroksylering og konjugering. Data om metabolittenes aktivitet savnes. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden ved steady state er 25–50 timer

Indikasjoner

Behandling av klimakterielle plager hos kvinner med intakt uterus.

Bivirkninger

Se også avsnittet om rene østrogenpreparater, [Bivirkninger](#). Gestagentillegget beskytter mot østrogeninduserte endometrieforandringer som hyperplasi og endometrie-cancer. Gestagen sammen med østrogen øker risiko for cancer mammae.

Informasjon til pasient

Gjør oppmerksom på hva pasienten kan forvente av blødninger med de ulike regimer (månedlige blødninger med sekvenspreparater og uforutsigbar blødning i de første måneder med den kontinuerlige behandlingen).

L14.1.3.1. Østrogen–gestagen, konstant hormoninnhold

Publisert: 13.09.2016

L14.1.3.1.1. Østradiol–medroksyprogesteron

Publisert: 13.09.2016

Se også

For legemiddelomtale, se [Østrogen–gestagen](#)

Indivina Orion Corporation Orion Pharma

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|--|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Østradiol: 1 mg Medroksyprogesteron: 2.5 mg | 3×28 stk | C | b | 330,90 |

Indivina Orion Corporation Orion Pharma

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|--|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Østradiol: 1 mg Medroksyprogesteron: 5 mg | 3×28 stk | C | b | 327,50 |
| Tablett | Østradiol: 2 mg Medroksyprogesteron: 5 mg | 3×28 stk | C | b | 327,50 |

Indivina Orion Corporation

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|--|----------|-------|------|------|
| Tablett | Østradiol: 1 mg Medroksyprogesteron: 2.5 mg | 3×28 stk | C | | – |
| Tablett | Østradiol: 1 mg Medroksyprogesteron: 5 mg | 3×28 stk | C | | – |
| Tablett | Østradiol: 2 mg Medroksyprogesteron: 5 mg | 3×28 stk | C | | – |

L14.1.3.1.2. Østradiol–noretisteronPublisert: 13.09.2016
Sist endret: 29.03.2017**Se også**For legemiddelomtale, se [Østrogen–gestagen](#)**Dosering og administrasjon**

- *Tabletter:* En tablett daglig, kontinuerlig uten opphold
- *Depotplaster:* Plasteret skiftes hver 3. til 4. dag

Activelle Novo Nordisk A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|---|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Østradiol: 1 mg Noretisteron: 0.5 mg | 3×28 stk | C | b | 284,10 |

Eviana Novo Nordisk A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|---|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Østradiol: 0.5 mg Noretisteron: 0.1 mg | 3×28 stk | C | b | 641,10 |

Cliovelle Dr. Kade Pharmazeuyische Fabrik GmbH

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|---|--------|-------|------|--------|
| Tablett | Østradiol: 1 mg Noretisteron: 0.5 mg | 84 stk | C | b | 284,10 |

Estalis Sandoz A/S

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|--|----------|-------|------|--------|
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog Noretisteron: 250 mikrog | 24×1 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog Noretisteron: 250 mikrog | 24×1 stk | C | b | 881,90 |

Kliogest Novo Nordisk

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|
| Tablett | Østradiol: 2 mg Noretisteron: 1 mg | 3×28 stk | C | | – |

Kliogest N Novo Nordisk

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|
| Tablett | Østradiol: 2 mg Noretisteron: 1 mg | 3×28 stk | C | | – |

Noresmea Sandoz - København

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|---|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Østradiol: 1 mg Noretisteron: 0.5 mg | 3×28 stk | C | b | 284,10 |

L14.1.3.2. Østrogen–gestagen, variabelt hormoninnhold

Publisert: 13.09.2016

Se også[Gestagener](#), [Østrogener](#) og [Østrogen–gestagen](#)**L14.1.3.2.1. Østradiol–noretisteron**

Publisert: 13.09.2016

Se ogsåFor legemiddelomtale, se [Østrogen–gestagen](#)**Dosering og administrasjon**

- *Tabletter:* Kalenderpakning med en tablett daglig, først rent østradiol, så kombinasjon av østradiol og noretisteron.
- *Depotplaster:* Plaster skiftes to faste dager hver uke. I de første to ukene brukes plaster med østradiol, i de siste to ukene brukes en kombinasjon av østradiol og noretisteron.

Novofem Novo Nordisk A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|---------------------------------------|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Østradiol: 1 mg Noretisteron: 1 mg | 3×28 stk | C | b | 230,10 |

Trisekvens Novo Nordisk A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|-------|------|--------|
| Tablett | | 3×28 stk | C | b | 243,40 |

Sequidot Sandoz A/S

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|--|----------|-------|------|--------|
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog Noretisteron: 250 mikrog | 24×1 stk | C | | – |
| Depotplaster | Østradiol: 50 mikrog | 24×1 stk | C | b | 881,90 |

Sequidot Sandoz A/S

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | R.gr. | Ref. | Pris |
|------|--------------------------|-------|------|------|
| | Noretisteron: 250 mikrog | | | |

L14.1.4. Tibolon

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 21.02.2018

Egenskaper

Syntetisk steroid med både østrogen, gestagen og androgen effekt. Omdannes raskt til tre ulike metabolitter, som binder seg til de tre respektive reseptortypene. Det har østrogeneffekt på vaginalslimhinne og beinvev, tilstrekkelig gestagen effekt på endometriet til å hemme blødning og positiv virkning på libido og sinnstilstand.

Farmakokinetikk

Absorberes raskt etter peroral tilførsel. Metaboliseres raskt og i stor grad i leveren til aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces, metabolisert. Halveringstiden er 6–10 timer.

Indikasjoner

Symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Forebygging av knokkelmineraltap hos kvinner disponert for osteoporose.

Dosering og administrasjon

En tablett daglig kontinuerlig.

Bivirkninger

Gjennombruddsblødning, spotting, utflod og mastalgi, fortrinnsvis den første måneden. Sjeldnere bivirkninger er hodepine, svimmelhet, kvalme, ødemer, kløe, vektøkning, eksantem, hirsutisme, depresjon. Økt risiko for brystkreft i samme grad som østrogen.

Graviditet, amming

Graviditet: Klinisk erfaring mangler. Dyreforsøk har vist embryotoksisk og teratogen effekt. *Amming:* Opplysninger om morsmelk mangler. Det anbefales tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. mulig androgen effekt på barnet.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved leversykdom.

Kontraindikasjoner

Kjente hormonavhengige tumores (brystkreft). Gjennomgått tromboembolisk sykdom. Alvorlig leversykdom.

Livial N.V. Organon - Kloosterstraat

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Tibolon: 2.5 mg | 3×28 stk | C | b | 486,90 |

Tibocina Sandoz - København

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Tibolon: 2.5 mg | 3×28 stk | C | b | 486,90 |

Tibolon Oresund Pharma Oresund Pharma ApS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Tibolon: 2.5 mg | 3×28 stk | C | b | 486,90 |

L14.2. Antikonsepsjonsmidler

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 30.01.2018

Se også

[Kvinnelige kjønnshormoner](#)

Forsiktighetsregler

Studier tyder på at hormonelle prevensjonsmidler kan øke risikoen for depresjon. Det er også vist økning i suicidforsøk og suicide. Se:

[Deprimert av p-piller?](#) Tidsskriftet 2016

Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV et al. Association of hormonal contraception with depression. JAMA Psychiatry 2016. E-publisert 28.9.2016.

Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, et al. Association of Hormonal Contraception With Suicide Attempts and Suicides. Am J Psychiatry. 2017 Nov 17;appiajp201717060616. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17060616. (Original Study) PMID: 29145752

L14.2.1. Østrogen–gestagen (kombinasjons p-midler)

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 21.10.2016

Se også

[Gestagener](#) og [Østrogener](#)

Egenskaper

Preparatene inneholder en kombinasjon av et østrogen (etinyløstradiol) og et gestagen (ulike typer). P-pillene har enten konstant (monofasepreparater) eller varierende (sekvenspreparater) hormoninnhold. Innholdet av østrogen per tablett i de ulike typene kombinasjonspreparater varierer fra 20 til 35 µg etinyløstradiol eller fra 1 til 3 mg østradiol. Gestagener har ulik potens og ulik effektprofil ut i fra deres evne til å binde seg til reseptorer for progesteron, androgen, mineralkortikoid, glukokortikoid og østrogen. De kan derfor ikke sammenlignes på vektbasis. Alle gestagener har per definisjon affinitet til progesteronreseptoren. Levonorgestrel har dessuten en viss androgen effekt. Noretisteron, etonogestrel og norelgestromin har også en svak, men signifikant androgen virkning, og noretisteron har i tillegg en svak østrogen effekt. Desogestrel har praktisk talt ingen androgen virkningskomponent. Drospirenon har en lett antiandrogen og antimineralkortikoid effekt. Cyproteron har kraftig antiandrogen virkning. *Virkningsmekanisme:* Hemning av oocytmodning og ovulasjon er den viktigste antikseptive effekten. I tillegg endres cervixsekret slik at dette blir mindre gjennomtrengelig for spermier og endometriet slik at et ev. befruktet egg vanskeligere fester seg. Sikkerheten angitt som Pearl indeks (antall graviditeter per 100 brukere i ett år) er 0,2–3.

Indikasjoner

Antikonsepsjon. (Andre indikasjoner, se [Kvinnelige kjønnshormoner](#)).

Bivirkninger

- *Vanlige:* Kvalme, blødningsforstyrrelser, endringer i humør og nedsatt libido, væskeretensjon, mastalgi, hodepine.
- *Hjerte- og karsykdom:* P-piller øker risiko for venøs tromboembolisk sykdom. Dette er hovedsakelig en østrogeneffekt. Relativ risiko hos brukere er ca. 2–5 i forhold til ikke-brukere. Insidensraten for ikke-brukere er ca. 5 per 100 000 per år i den aktuelle aldersgruppen. Tromboserisikoen er størst det første året. Epidemiologiske studier tyder på at tromboserisiko er lavere ved p-piller som inneholder levonorgestrel enn de nyere kombinasjoner som inneholder desogestrel og drospirenon.

| Tabellen viser hvor mange blodpropp som vil oppstå hos 10 000 unge kvinner i løpet av ett år* | |
|---|---|
| Friske kvinner som ikke bruker p-piller | 2 |
| Minipiller (som Cerazette og Concludag) | 2 |

| Tabellen viser hvor mange blodpropp som vil oppstå hos 10 000 unge kvinner i løpet av ett år* | |
|--|----------------------------|
| P-piller med østrogen og levonorgestrel (som Loette, Oralcon, Microgynon) | 5–7 |
| P-piller med østrogen og noretisteron (som Synfase) | 5–7 |
| P-piller med østrogen og drospirenon (som Yasmin, Yasminelle og Yaz) | 9–12 |
| P-piller med østrogen og desogestrel (som Marvelon og Mercilon) | 9–12 |
| P-plaster og p-ring (som Evra og Nuvaring) | 6–12 |
| P-pille med østrogen og dienogest (som Qlaira) | Nøyaktig risiko ikke kjent |
| P-pille med østrogen og nomegestrol (som Zoely) | Nøyaktig risiko ikke kjent |

Bruk av p-piller gir en lett økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, med relativ risiko ca. 1,5. Denne risikoen øker ved røyking og hypertensjon og med økende alder > 35–40 år. Blodtrykksstigning kan forekomme under p-pillebruk, som regel bare en lett økning, men i sjeldne tilfeller så uttalt at man må seponere. *Samlet vurdering:* Kvinner som ikke røyker og ikke har hypertensjon eller andre kjente risikofaktorer, kan vanligvis bruke p-piller helt frem til overgangsalderen med liten risiko for hjerte- og karsykdom.

- *Kreft:* Bruk av p-piller har en markert beskyttende effekt mot ovarialkreft (risikoen er mer enn halvert) og mot endometriekreft. Disse effektene kan vedvare i mange år etter seponering. Risikoen for å utvikle brystkreft er moderat økt (ca. 25 %) hos kvinner som bruker p-piller. Effekten avtar gradvis etter avsluttet bruk. 10 år etter seponering er det ikke lenger noen påviselig overhyppighet av brystkreft hos kvinner som har brukt p-piller. Cervixkreft forekommer hyppigere hos kvinner som har brukt p-piller. Noe av dette antas å være en følge av at kvinnene ikke bruker barrièremetoder (kondom) som gir infeksjonsbeskyttelse, men kan også skyldes en direkte effekt av p-pillene på cervixepitelet. Leveradenom og hepatokarsinom er påvist hos p-pillebrukere, og en årsakssammenheng er sannsynlig, men disse tilstandene er meget sjeldne. *Samlet vurdering:* Beregninger tyder på at de negative og positive effektene av p-piller på kreftforekomst svært nær balanserer hverandre.
- *Leveraffeksjon:* Symptomgivende affeksjon av lever er sjelden, men kan forekomme, særlig kolestaseikterus. P-piller gir noe økt hyppighet av gallesteinssykdom.
- *Metabolske effekter:* Økt blodglukose og redusert glukosetoleranse er observert. Diabetikere kan få økt insulinbehov. Preparater som inneholder gestagen med en androgen virkningskomponent kan gi en lett senkning i forholdet HDL-/LDL-kolesterol.
- *Effekt på senere fertilitet:* Det kan ta noe tid før ovulasjon kommer i gang etter seponering. Imidlertid er det 1 år etter seponering ingen påvisbar reduksjon av fertilitet.
- *Psykiske effekter:* Noe økt tendens til depresjon, særlig ved bruk av p-plaster, p-ring og hormonspiral.

Graviditet, amming

Graviditet: Den samlede erfaring ved utilsiktet bruk av hormonell antikonsepsjon tidlig i svangerskapet har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt. *Amming:* Overgang av perorale antikonsepsjonsmidler til morsmelk er liten. Østrogener og gestagener i større mengder kan hemme melkeproduksjon. Selv om mengden østrogen i kombinasjonsantikonseptiva er lav, kan melkeproduksjonen reduseres initialt.

Forsiktighetsregler

Før forskrivning, må anamnese og familieanamnese foretas. Forhold som krever risikoavveining er hjerte- og karsykdommer, kjent hyperlipidemi, hypertensjon, røyking, diabetes mellitus (også tidligere graviditetsdiabetes), preeklampsi i tidligere svangerskap, leversykdom, alder, migrene. Ved familiær trombosetendens bør APC-resistens (resistens mot aktivert protein C) måles, ev. også protein C, protein S og antitrombin ved fravær av APC-resistens. Risiko for arteriell trombose øker med kvinnens alder. Bruk av visse antiepileptika kan redusere p-pillens sikkerhet pga. raskere hepatisk inaktivering. Tilsvarende effekt kan sees av johannesurt. Dersom migrenelignende hodepine oppstår, bør p-pille seponeres. Gynekologisk undersøkelse utføres ved behov (chlamydia- eller cytologiscreening). Måling av blodtrykk og palpasjon av mammae.

Det er sendt ut eget [Kjære helsepersonell-brev](#) (2014) om forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle risikofaktorer.

Kontraindikasjoner

Tidligere arteriell eller venøs trombolisme eller økt risiko for slik sykdom. Alvorlig hypertensjon. Cancer mammae og andre østrogenfølsomme tumores. Udiagnostisert unormal vaginalblødning. Leversykdom med alvorlig forstyrrelse av leverfunksjon, ikterus, porfyri, Rotors syndrom, Dubin-Johnsons syndrom. Pemfigoid gestationes. Migrene med aura. Røykere over 35 år.

Kontroll

Normalt årlige kontroller. Chlamydia- og cervixcytologisk prøve etter nasjonale retningslinjer. Blodtrykkskontroll.

Informasjon til pasient

Gjennomgang av brukerveiledning. Betydning av regelmessig inntak. Ved forglemmelse tas pille så snart som mulig, men ved forglemmelse utover 24 timer må annen prevensjon benyttes i en uke samtidig som man fortsetter ut brettet med p-piller. Samme forholdsregler kan gjelde ved diaré/oppkast. Ved start 1.–2. menstruasjonsdag (eller 1.–2. dag etter abort) oppnås umiddelbart prevensjonssikkerhet. Ved oppstart senere i syklus må det brukes tilleggsprevensjon (barriere) i de første åtte dager. Med monofasisk behandling kan menstruasjonen utsettes ved at man fortsetter på neste brett uten pause til et par dager før blødning er ønsket. Pasienten må informeres om symptomer på venøs trombose og seponering av p-pille ved langvarig fysisk inaktivitet.

L14.2.1.1. Monofasepreparater; p-piller, p-vaginalring, p-plaster

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 15.11.2018

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Østrogen–gestagen \(kombinasjons p-midler\)](#)

Egenskaper

Konstant hormoninnhold.

Farmakokinetikk

- *Etinyløstradiol*: Biotilgjengeligheten er ca. 45 % ved peroral tilførsel og ca. 25 % ved vaginal tilførsel. Metaboliseres i leveren hovedsakelig ved hydroksylering. Er gjenstand for en svak førstepassasjemetabolisme samt enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles via nyrene, metabolisert, og via gallen i feces i like store mengder. Halveringstiden er ca. 20 timer.
- *Østradiol*: Gjennomgår omfattende førstepassasjemetabolisme, bare 3 % av biologisk østradiol er tilgjengelig. Hovedmetabolittene er østron, østronsulfat og østronglukuronid som hovedsakelig utskilles med urin. Halveringstid etter peroralt inntak er 13–20 timer.
- *Desogestrel*: Biotilgjengelighet er ca. 70 %. Metaboliseres i gastrisk mucosa og i leveren ved oksidering til aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene og i feces. Halveringstiden for aktiv substans er 30 timer.
- *Dienogest*: Biotilgjengeligheten er 90 % eller mer ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren ved hydroksylering og konjugering. Inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er 7–12 timer.
- *Drospirenon*: Biotilgjengeligheten er ca. 75 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren. Inaktive hovedmetabolitter. Utskilles via nyrene, metabolisert, og i feces, i like store mengder. Halveringstiden er tofasisk: Initialt ca. 1,5 time, deretter terminalt ca. 40 timer.
- *Etonogestrel*: Biotilgjengeligheten er 100 % ved vaginal tilførsel. Metaboliseres delvis i leveren via CYP3A4. Utskilles via nyrene og via gallen i feces, i like store mengder. Halveringstiden terminalt er 25–30 timer.
- *Levonorgestrel*: Se [Farmakokinetikk](#).
- *Nomegestrol*: Absorberes raskt med maksimal konsentrasjon etter 2 timer. Biotilgjengelighet er ca. 63 %. Metaboliseres i lever via CYP3A4 og -3A5. Halveringstid er ca. 46 timer. Utskilles via nyrene og i feces.
- *Norelgestromin*: Absorpsjonen er god ved transdermal tilførsel. Metaboliseres i leveren til bl.a. aktivt norgestrel. Utskilles via nyrene, metabolisert, og via gallen i feces, i like store mengder. Halveringstiden er ca. 28 timer.
- *Noretisteron*: Se [Farmakokinetikk](#).

Indikasjoner

- Antikonsepsjon.
- Andre indikasjoner: Dysmenoré, premenstruell tensjon, endometriose, se [Kvinnelige kjønnshormoner](#).

Dosering og administrasjon

Utførlig bruksanvisning følger pakningene.

- *Vanlig bruk:* En tablett daglig i 21 (eller 24) dager, deretter opphold (ev. placebotabletter) i 7 (eller 4) dager. Et plaster påsettes hver uke i tre uker, deretter en ukes pause. En vaginalring innsettes og fjernes etter tre uker, deretter en uke uten ring. Man starter behandling på en av de første dagene av menstruasjon (de fleste fabrikantene angir første dag).
- *Kontinuerlig bruk:* Med monofasepreparater er det mulig å utsette månedlig blødning ved å forlenge syklus uten opphold i behandling. Studier har vist god sikkerhet ved forlenget syklus på opp til 10–12 måneder med amenore hos 80–100 %. Ved gjennombruddsblødninger anbefales tre dagers pause med tablettinntak, det vil ikke svekke sikkerheten.

Overdosering

Se [A \(G12.5.1\)](#).

Informasjon til pasient

Se [Informasjon til pasient](#). Kombinasjons-p-piller finnes som 21/7 regime (21 dager aktiv behandling og 7 dager hormonfritt intervall) eller som 24/4 regime (24 dager aktiv behandling og 4 dager hormonfritt intervall).

Diza MEDICAL VALLEY

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.03 mg Drospirenon: 3 mg | 3×21 stk | C | 254,30 |

Diza 28 MEDICAL VALLEY

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.03 mg Drospirenon: 3 mg | 3×28 stk | C | 272,50 |

Naiwanel MEDICAL VALLEY

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.02 mg Drospirenon: 3 mg | 3×21 stk | C | 322,40 |

Naiwanel 28 MEDICAL VALLEY

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.02 mg Drospirenon: 3 mg | 3×28 stk | C | 302,70 |

Evra Gedeon Richter Plc

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|--------------|--|---------|------------|-------|
| Depotplaster | Norelgestromin: 203 mikrog Etinyløstradiol: 33.9 mikrog | 9×1 stk | C | 378,- |

Kelzyn Exeltis Healthcare S.L.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|--------------|---|----------|------------|--------|
| Depottablett | Dienogest: 2 mg Etinyløstradiol: 0.02 mg | 3×28 stk | C | 466,80 |

Mirabella Exeltis Healthcare S.L.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|--|----------|------------|--------|
| Tablett | Levonorgestrel: 100 mikrog Etinyløstradiol: 20 mikrog | 3×28 stk | C | 323,30 |

Ornibel Exeltis Healthcare S.L.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|----------------|--|---------|------------|--------|
| Vaginalinnlegg | Etonogestrel: 0.12 mg Etinyløstradiol: 0.015 mg | 3×1 stk | C | 366,10 |

Loette 28 Pfizer AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|--|----------|------------|--------|
| Tablett | Levonorgestrel: 100 mikrog Etinyløstradiol: 20 mikrog | 3×28 stk | C | 323,30 |

Marvelon 28 N.V. Organon - Kloosterstraat

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Desogestrel: 150 mikrog Etinyløstradiol: 30 mikrog | 3×28 stk | C | 197,60 |

Mercilon 28 N.V. Organon - Kloosterstraat

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|-------|
| Tablett | Desogestrel: 150 mikrog Etinyløstradiol: 20 mikrog | 3×28 stk | C | 134,- |

Nuvaring N.V. Organon - Kloosterstraat

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|----------------|--|---------|------------|--------|
| Vaginalinnlegg | Etonogestrel: 0.12 mg Etinyløstradiol: 0.015 mg | 3×1 stk | C | 367,70 |

Melleva Exeltis Healthcare S.L. (1)

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|--|----------|------------|-------|
| Tablett | Levonorgestrel: 150 mikrog Etinyløstradiol: 30 mikrog | 3×21 stk | C | 88,90 |

Slinda Exeltis Healthcare S.L. (1)

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|------------|-------|
| Tablett | Drospirenon: 4 mg | 3×28 stk | C | 360,- |

Microgynon Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|--|----------|------------|-------|
| Tablett | Levonorgestrel: 150 mikrog Etinyløstradiol: 30 mikrog | 3×21 stk | C | 88,90 |

Yasmin Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.03 mg Drospirenon: 3 mg | 3×21 stk | C | 254,30 |

Yasmin 28 Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.03 mg Drospirenon: 3 mg | 3×28 stk | C | 272,50 |

Yasminelle Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.02 mg Drospirenon: 3 mg | 3×21 stk | C | 322,40 |

Yasminelle 28 Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.02 mg Drospirenon: 3 mg | 3×28 stk | C | 302,70 |

Yaz Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.02 mg Drospirenon: 3 mg | 3×28 stk | C | 329,70 |

Oralcon CampusPharma AB

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|--|----------|------------|-------|
| Tablett | Levonorgestrel: 150 mikrog Etinyløstradiol: 30 mikrog | 3×21 stk | C | 88,90 |

Yana Heaton k.s

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Dienogest: 2 mg Etinyløstradiol: 0.03 mg | 3×21 stk | C | 345,90 |

Yasmin Bayer

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|--------|------------|------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.03 mg Drospirenon: 3 mg | 21 stk | C | – |

Yasminelle 28 Bayer

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.02 mg Drospirenon: 3 mg | 3×28 stk | C | – |

Yasminelle Orifarm AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|--------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.02 mg Drospirenon: 3 mg | 3×21 stk | C | 322,40 |

Yasminelle Jenapharm

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.02 mg Drospirenon: 3 mg | 3×21 stk | C | – |

Yaz Jenapharm

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|---|----------|------------|------|
| Tablett | Etinyløstradiol: 0.02 mg Drospirenon: 3 mg | 3×28 stk | C | – |

Zoely Theramex Ireland Limited

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|--|----------|------------|-------|
| Tablett | Nomegestrol: 2.5 mg Østradiol: 1.5 mg | 3×28 stk | C | 315,- |

L14.2.1.2. Sekvenspreparater; p-piller

Publisert: 13.09.2016

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Østrogen–gestagen \(kombinasjons p-midler\)](#)

Egenskaper

Variierende hormoninnhold.

Indikasjoner

Antikonsepsjon.

Dosering og administrasjon

Leveres i datopakninger med utførlig bruksanvisning.

Overdosering

Se [A \(G12.5.1\)](#).

Informasjon til pasienten

Ved overgang til Qlaira fra et annet kombinert, hormonelt prevensjonsmiddel: Begynn med Qlaira dagen etter at den siste virksomme tablett (den siste tablett som inneholder virkestoff) av den tidligere p-pillen er tatt.

Qlaira Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|---------|-------------------|----------|------------|--------|
| Tablett | | 3×28 stk | C | 346,10 |

Qlaira Bayer AG

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|-------|------|------|
| Tablett | 28 stk | C | | – |

Synfase Pfizer AS

| Form | Virkestoff/styrke | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|-------|------|--------|
| Tablett | 6×21 stk | C | | 154,60 |
| Tablett | 3×21 stk | C | | 95,40 |

L14.2.2. Gestagen (antikonsepsjon)

Publisert: 13.09.2016

Se også[Gestagener](#)**Egenskaper**

Gestagen i lav dose endrer cervixsekret slik at spermene vanskeligere trenger igjennom og gir atrofiske endringer i endometriet. Gestagen i høyere dose hemmer ovulasjon effektivt og hemmer endometrievækst.

Indikasjoner

- Antikonsepsjon, inkludert postkoital (Norlevo)
- Andre indikasjoner, se [Kvinnelige kjønnshormoner](#)

Bivirkninger

Blødningsforstyrrelser (hyppige, uregelmessige blødninger), spesielt i starten av behandlingen. Kvalme, mastalgi, hodepine, libidoendringer (disse er ofte forbigående). Funksjonelle ovarialcyster. Inntrer graviditet under bruk av minipille, er det større risiko for at den kan være ekstrauterin.

Graviditet, amming

Graviditet: Enkelte gestagener (etisteron, noretisteron) har vært assosiert med maskulinisering av genitalia i pikefostre, spesielt ved bruk av høye doser. Hypospadi har også vært rapportert, men årsakssammenhengen er ikke sikker. Det er ingen holdepunkter for at gestagener i de doser som inngår i p-piller, medfører risiko for skadelige effekter. *Amming:* Overgangen av perorale antikonsepsjonsmidler til morsmelk er liten. Østrogener og gestagener i større mengder kan hemme melkeproduksjon. Minipillen og gestagenpiller, anbefales fremfor kombinasjonspiller i ammeperioden.

Forsiktighetsregler

Tidligere hjertesykdom. Gestagener kan brukes ved hypertensjon, men krever regelmessig kontroll av blodtrykket. For øvrig gjelder de samme forsiktighetsregler som for kombinasjons p-piller, se [Forsiktighetsregler](#), men risikoen for venøs tromboembolisme øker ikke ved bruk av rent gestagen.

Kontraindikasjoner

Udiagnostisert unormal vaginalblødning. Alvorlig arteriell sykdom. Alvorlige leverfunksjonsforstyrrelser, leveradenomer, porfyri.

Kontroll

Det kan være hensiktsmessig med kontroll etter tre måneder. Senere normalt årlige kontroller. Gynekologisk undersøkelse med chlamydia screening og cervixcytologisk prøve etter nasjonale retningslinjer.

Informasjon til pasient

Informert om risikoen for blødningsforstyrrelser. Ved opphør av menstruasjon bør det tas graviditetstest. Hvis den er negativ, er det ikke nødvendig med gjentakelse (med mindre kvinnen har mistanke om graviditet).

L14.2.2.1. Perorale gestagener

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 14.11.2017

Se også

Vedrørende **indikasjoner, bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Gestagen \(antikonsepsjon\)](#)

Egenskaper

Kontinuerlig tilførsel av gestagenet noretisteron i dose på 350 µg daglig (minipille) har høyere graviditetsfrekvens enn p-pille (Pearl indeks 0,3–4). Effekten er hovedsakelig å gjøre cervixsekretet impermeabelt for spermiepassasje. Daglig tilførsel av gestagenet desogestrel (75 µg) vil i tillegg til «minipilleeffekten» på cervixsekretet også hindre ovulasjon. Det medfører samme sikkerhet som p-pille av kombinasjonstypen (Pearl indeks 0,2–3).

Farmakokinetikk

- *Noretisteron*: Se L3.10.2.3 [Farmakokinetikk](#)
- *Desogestrel*: Se L3.11.1.1 [Farmakokinetikk](#)

Dosering og administrasjon

En tablett daglig uten avbrytelse.

Informasjon til pasient

Informasjon om betydning av regelmessig daglig inntak uten pauser. Sikker antikonsepsjon fra første dag hvis det startes første dag i syklus, ellers ikke sikker før etter syv dager. Ved overskridelse av tidspunkt for inntak med mer enn tre timer for noretisteron eller 12 timer for desogestrel reduseres sikkerheten, og annen prevensjon bør brukes i tillegg de neste 7 dager. Ved forglemmelse tas tablett så snart som mulig samtidig som neste tablett tas til vanlig tid. Samme forholdsregler gjelder ved diaré/oppkast.

Cerazette N.V. Organon - Kloosterstraat

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|------------------------|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Desogestrel: 75 mikrog | 3×28 stk | C | | 193,70 |

Conludag Pfizer AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-----------------------|----------|-------|------|-------|
| Tablett | Noretisteron: 0.35 mg | 3×28 stk | C | | 90,80 |

Desirett Exeltis Healthcare S.L. (1)

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|------------------------|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Desogestrel: 75 mikrog | 3×28 stk | C | | 193,70 |

Mini-Pe Pfizer

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-----------------------|----------|-------|------|------|
| Tablett | Noretisteron: 0.35 mg | 3×28 stk | C | | – |

Vinelle CampusPharma AB

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|------------------------|----------|-------|------|--------|
| Tablett | Desogestrel: 75 mikrog | 3×28 stk | C | | 193,70 |

L14.2.2.2. Postkoital antikonsepsjon / Angrepille

Publisert: 13.09.2016

Se også

For mer informasjon og vedrørende **graviditet og amming, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Gestagen \(antikonsepsjon\)](#)

Egenskaper

Antas primært å hemme eller forsinke ovulasjon (begge). Hos noen kvinner kan også follikkelrupturen forsinkes (ulipristal).

Farmakokinetikk

Levonorgestrel: Se [Farmakokinetikk](#). *Ulipristal*: Selektiv progesteronreseptormodulator. Effektiviteten er tilsynelatende bedre enn med levonorgestrel. Maksimal plasmakonsentrasjon ca. 1 time etter peroralt inntak. Halveringstid ca. 32 timer etter inntak. Metaboliseres i lever, hovedsakelig av CYP3A4, og i liten grad av CYP1A2 og CYP2D6.

Dosering og administrasjon

Levonorgestrel 1,5 mg som peroral engangsdose, helst innen 12 timer og senest innen 72 timer (3 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. *Ulipristal* 30 mg som peroral engangsdose, senest innen 120 timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt.

Bivirkninger

Levonorgestrel: mastalgi, blødningsforstyrrelser, magesmerter og kvalme. *Ulipristal*: Vanlige: mastalgi, blødningsforstyrrelser, magesmerter, kvalme, stemningsleieforstyrrelser, hodepine, svimmelhet, tretthet, myalgi. Mindre vanlige: vaginitt, urinveisinfeksjon, ØLI, angst, insomni, migrene, synsforstyrrelser, hetetokter, akne. Også rapportert: dehydrering, desorientering, synkope, svekket oppmerksomhet, fotofobi, tannverk, urtikaria, nefrolitiasis.

Graviditet, amming

Levonorgestrel: Se [Graviditet, amming levonorgestrel](#).

Ulipristal: *Graviditet*: Kontraindisert ved graviditet. *Amming*: Kontraindisert under amming. Ulipristalacetat og dens aktive mono-N-demetylerede metabolitt utskilles i brystmelk med et gjennomsnittlig AUC_t melk:plasma-forhold på 0,74±0,32 for ulipristalacetat. Effekten på nyfødte/spedbarn er ikke undersøkt. Risiko for nyfødte/spedbarn kan derfor ikke utelukkes.

Forsiktighetsregler

Nødprensjon skal bare brukes leilighetsvis. Den bør ikke erstatte vanlig prevensjon. Bruk av preparatet flere ganger i samme menstruasjonssyklus anbefales ikke. Postkoital antikonsepsjon hindrer ikke graviditet i alle tilfeller. Bruk av vanlig hormonprevensjon er ikke kontraindisert, men preparatet kan redusere den svangerskapsforebyggende virkningen. Etter bruk av nødprensjon anbefales barrieremetode (kondom) ved påfølgende samleier til neste menstruasjonsperiode starter. Ved oppkast innen tre timer må behandlingen gjentas. Postkoital antikonsepsjon anbefales ikke til pasienter med risiko for ektopisk svangerskap eller til pasienter som tidligere har hatt salpingitt eller ektopisk svangerskap. Anbefales ikke til pasienter med kraftig nedsatt leverfunksjon. Bruk av ulipristal hos kvinner med alvorlig astma anbefales ikke fordi ulipristalacetat har høy affinitet for glukokortikoidreseptorer, og anti-glukokortikoide effekter har blitt observert i dyrestudier.

Informasjon til pasient

Tabletten kan tas med eller uten mat. Effekten er sikrere jo tidligere tabletten tas etter det ubeskyttede samleiet eller prevensjonssvikt, senest innen 72 timer (levonorgestrel) eller 120 timer (ulipristal). Det må brukes kondom frem til neste menstruasjon som kan komme både tidligere eller senere enn forventet.

Femke Exeltis Healthcare S.L.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|-------|-------|------|------|
| Tablett | Ulipristal: 30 mg | 1 stk | F | | – |

Levonorgestrel Norfri Evolan Pharma AB

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|------------------------|-------|-------|------|------|
| Tablett | Levonorgestrel: 1.5 mg | 1 stk | F | | – |

Norlevo Laboratoire HRA Pharma

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|------------------------|-------|-------|------|------|
| Tablett | Levonorgestrel: 1.5 mg | 1 stk | F | | – |

ellaOne LABORATOIRE HRA PHARMA (1)

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|-------|-------|------|------|
| Tablett | Ulipristal: 30 mg | 1 stk | F | | – |

L14.2.2.3. Gestagen livmorinnlegg

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 28.09.2017

Egenskaper

Intrauterint innlegg som frigjør 14 til 20 µg levonorgestrel per døgn med en jevn hastighet, direkte i uterus, over en periode på 5 år (Mirena). Jaydess avgir 14 µg levonorgestrel per døgn etter innsetting, synkende til 5 µg per døgn etter 3 år. Gir hovedsakelig lokale gestagene effekter på endometriet.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er god og stabil ved intrauterin tilførsel. Se for øvrig [Farmakokinetikk](#).

Indikasjon

Antikonsepsjon. Blødningsforstyrrelser (se [Gestagen livmorinnlegg, hormonspiral](#)).

Dosering og administrasjon

Skiftes hvert 5. år (Mirena), hvert 3. år (Jaydess), kanskje sjeldnere. Levosert skiftes innen 3 år.

Bivirkninger

Se [Bivirkninger](#). Amenoré forekommer hos ca. 20 %. Blødningsforstyrrelser i form av metroragi eller spotting er vanlig, spesielt i starten.

Forsiktighetsregler

Det er sendt ut eget [Kjære helsepersonell-brev](#) om mulig feilmontert innføringshylse på Mirena (2016)

Jaydess Bayer AB - Solna

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking!

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------------|-------------------------|-------|-------|------|---------|
| Intrauterint innlegg | Levonorgestrel: 13.5 mg | 1 stk | C | | 1 306,- |

Kyleena Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------------|-------------------------|-------|-------|------|----------|
| Intrauterint innlegg | Levonorgestrel: 19.5 mg | 1 stk | C | | 1 414,60 |

Mirena Bayer AB - Solna

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|------|----------|
| Intrauterint innlegg | Levonorgestrel: 20 mikrog | 1 stk | C | | 1 482,30 |

Levosert Gedeon Richter Plc

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|------|----------|
| Intrauterint innlegg | Levonorgestrel: 20 mikrog | 1 stk | C | | 1 482,30 |

L14.2.2.4. Gestagenimplantat

Publisert: 13.09.2016Sist endret: 30.01.2020

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og informasjon**, se [Gestagen \(antikonsepsjon\)](#)

Egenskaper

Etonogestrel (som er identisk med den aktive metabolitten av desogestrel) som implantat med effekt i minst tre år.

Farmakokinetikk

Etonogestrel: Absorberes raskt i kretsløpet. Ovulasjonshemmende konsentrasjon oppnås innen 1 døgn, maksimal innen 1–13 døgn. Se for øvrig [Farmakokinetikk](#)

Dosering og administrasjon

Ett implantat settes subkutant. For implantasjons- og fjerningsteknikk, se spesiallitteratur. Se eventuelt [Kjære helsepersonell-brev](#) (januar 2020) for instruksjoner og lenke til demonstrasjonsvideo.

Forsiktighetsregler

Implantatet settes subkutant. Det er i sjeldne tilfeller meldt om at p-staven har flyttet på seg, og er funnet igjen andre steder i kroppen. Implantatet bør derfor settes inn og fjernes av helsepersonell med opplæring. Det er sendt ut eget [Kjære helsepersonell-brev](#) (2016)

Det er observert at forflytning av implantatet kan føre til skade på nerver og blodårer, og i sjeldne tilfeller har det forflyttet seg til lungepulsåren. Dette kan skyldes feil eller for dyp innsetting. Det er utsendt ytterligere et [Kjære helsepersonell-brev](#) (januar 2020).

Nexplanon N.V. Organon - Kloosterstraat

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------|---------------------|-------|-------|------|----------|
| Implantat | Etonogestrel: 68 mg | 1 stk | C | | 1 436,60 |

L14.2.2.5. Gestageninjeksjon

Publisert: 13.09.2016

Se også

Vedrørende **graviditet og amming, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Gestagen \(antikonsepsjon\)](#)

Egenskaper

Progestogenpreparat. Sikkerheten er høy og er sammenlignbar med p-piller av kombinasjonstypen. Svært god depoteffekt. Halveringstid 5–6 uker.

Dosering og administrasjon

150 mg intramuskulært hver 12. uke.

Bivirkninger

Se [Bivirkninger](#). Amenoré er hyppig med p-sprøyte. P-sprøyte kan gi reduksjon av HDL-kolesterol. P-sprøyte kan hemme beinoppbygging, spesielt hos unge kvinner med ikke ferdig utviklet skjelett.

Forsiktighetsregler

Se [Forsiktighetsregler](#). Depotmedroksyprogesteron (p-sprøyte) anbefales ikke brukt ved hypertensjon eller arteriell karsykdom. Bruk hos meget unge uten ferdigvokst skjelett må nøye vurderes i forhold til gevinsten (sikkerhet og mindre blødning).

Informasjon til pasient

Blødningsforstyrrelser i form av metroragi og spotting er vanlig i starten. Etter ett års bruk vil de fleste helt miste menstruasjonen. Det kan gå mange måneder etter siste sprøyte til fertiliteten gjenvinnes og regelmessig menstruasjon etableres.

For legemiddelomtaler og preparater, se (Depo-Provera)

[Medroksyprogesteron](#)

Kilder

[Antikonsepsjonsmidler](#)

L14.3. Progesteronreseptormodulerende midler

Publisert: 13.09.2016

L14.3.1. Ulipristal

Revidert: 02.07.2023

Indikasjoner

Ulipristal som postkoital antikonsepsjon, se [Postkoital antikonsepsjon / Angrepille](#).

Uterusmyomer: Ulipristal var tidligere indisert som behandlingskur preoperativt ved behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer hos voksne kvinner i fertil alder, og for intermitterende behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer hos voksne kvinner i fertil alder som ikke er aktuelle for kirurgi. Preparatene til denne bruken er nå avregistrert, etter oppdaget risiko for alvorlig leverskade.

Esmya Gedeon Richter Plc.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|--------|-------|------|---------|
| Tablett | Ulipristal: 5 mg | 28 stk | C | b | 1 390,- |

L14.4. Gonadotropiner og analoger av gonadotropinfrigjørende hormon

Publisert: 13.09.2016

L14.4.1. Gonadotropiner

Publisert: 13.09.2016

L14.4.1.1. Follitropin og urofollitropin

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 05.09.2018

Egenskaper

Follitropin er syntetisk, rekombinant, follikkelstimulerende hormon (FSH). Det har prinsipielt samme effekt som det fysiologiske FSH, dvs. induserer follikkelvekst og østrogenproduksjon i ovariet og stimulerer testiklens spermatogenese. Tre former av follitropin er markedsført, follitropin alfa, beta og delta. (De skiller seg fra hverandre bare ved små ulikheter i karbohydratkjeden i glykoproteinet og renseprosedyren etter syntesen.) Delta gir høyere eksponering enn alfa. Urofollitropin inneholder en høyrenset tilberedning av FSH ekstrahert fra urin

fra postmenopausale kvinner. Det stimulerer follikkelvekst og -utvikling samt gonadal steroidproduksjon hos kvinner med sekundær ovariesvikt.

Farmakokinetikk

- *Follitropin alfa*: Biotilgjengeligheten er ca. 70 % ved både intramuskulær og subkutan tilførsel. Data for metabolisme savnes. Utskilles via nyrene, ca. 10 %. Halveringstiden etter enkel dose gitt intravenøst er 18 timer, gitt subkutan 37 timer.
- *Follitropin beta*: Biotilgjengeligheten er ca. 77 % ved både intramuskulær og subkutan tilførsel. Biokjemisk svært likt humant urinbasert FSH og metaboliseres og utskilles på samme måte. Halveringstiden er 27–44 timer.
- *Follitropin delta*: Biotilgjengeligheten er ca. 64 %. Terminal halveringstid er 40 timer etter enkel og 28 timer etter gjentatt subkutan administrering. Antas å utskilles som andre follitropiner, dvs. hovedsakelig via nyrene.
- *Urofollitropin*: Data for biotilgjengelighet mangler. Etter subkutan injeksjon av enkle doser ble maksimal FSH-konsentrasjon nådd innen 21 timer. Steady state ble observert etter 4–5 dager. Etter 7 dager med gjentatt administrering, ble maksimal FSH-konsentrasjon nådd etter 10 timer. Halveringstiden er ca. 30 timer.

Indikasjoner

Induksjon av vekst av follikler i ovarier hos kvinner med påvist hypofysær svikt. Behandling av anovulasjon hvor klomifenbehandling har sviktet. Hormonell ovariestimulering som ledd i behandlingsprogrammer for assistert fertilisering. Gis som regel i behandlingsprotokoller kombinert med LH/HCG og GnRH-analoger. Follitropin benyttes dessuten i behandling av oligospermi ved hypothalamus/hypofysesvikt.

Dosering og administrasjon

Flere behandlingsregimer brukes. Valg av regime og dosering avhenger av pasientens funksjonsdefekt og respons. Oppgave for spesialist med spesialkompetansen innen infertilitetsbehandling.

Bivirkninger

Lokal reaksjon på injeksjonsstedet. Overstimulering av ovarier, cystedannelse, abdominalsmerter, kvalme, brystmerter, hodepine.

Kontroll og oppfølging

Utføres av spesialist. Kontroll av østradiolnivå og ultralydundersøkelse av ovarier.

Informasjon til pasient

Betydelig økt risiko for flerlingsvangerskap samt risiko for overstimulering.

Bemfola Gedeon Richter Plc

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------|------|-----------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 75 IE | 0.125 ml | C | | 277,10 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 150 IE | 10×0.25 ml | C | | 5 334,30 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 150 IE | 0.25 ml | C | | 599,60 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 225 IE | 10×0.375 ml | C | | 8 446,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 225 IE | 0.375 ml | C | | 905,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 300 IE | 0.5 ml | C | | 1 066,30 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 300 IE | 10×0.5 ml | C | | 10 336,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 450 IE | 0.75 ml | C | | 1 514,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 450 IE | 10×0.75 ml | C | | 14 820,90 |

Bemfola Orifarm AS

| <i>Form</i> | <i>Virkestoff/styrke</i> | | <i>R.gr.</i> | <i>Ref.</i> | <i>Pris</i> |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 150 IE | 0.25 ml | C | | 599,60 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 225 IE | 10×0.375 ml | C | | 8 446,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 225 IE | 0.375 ml | C | | 905,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 300 IE | 10×0.5 ml | C | | 10 336,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 300 IE | 0.5 ml | C | | 1 066,30 |

Bemfola 2care4 ApS

| <i>Form</i> | <i>Virkestoff/styrke</i> | | <i>R.gr.</i> | <i>Ref.</i> | <i>Pris</i> |
|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 225 IE | 0.375 ml | C | | 905,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 300 IE | 0.5 ml | C | | 1 066,30 |

Rekovelle 2care4 ApS

| <i>Form</i> | <i>Virkestoff/styrke</i> | | <i>R.gr.</i> | <i>Ref.</i> | <i>Pris</i> |
|-----------------------------|------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin delta: 72 mikrog | 2.16 ml | C | | 6 719,30 |

Fostimon Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

| <i>Form</i> | <i>Virkestoff/styrke</i> | | <i>R.gr.</i> | <i>Ref.</i> | <i>Pris</i> |
|---|--------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Urofollitropin: 75 IU | 1 Sett | C | | 232,40 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Urofollitropin: 150 IU | 10 Sett | C | | 4 014,90 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Urofollitropin: 150 IU | 1 Sett | C | | 434,10 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Urofollitropin: 300 IU | 1 Sett | C | | 795,50 |

Gonal-F Merck Europe B.V.

| <i>Form</i> | <i>Virkestoff/styrke</i> | | <i>R.gr.</i> | <i>Ref.</i> | <i>Pris</i> |
|-----------------------------|--------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 300 IE | 0.48 ml | C | | 1 117,90 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 450 IE | 0.72 ml | C | | 1 658,40 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 900 IE | 1.44 ml | C | | 3 263,70 |

Puregon Merck Sharp & Dohme B.V. (1)

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------|--------------------------|---------|-------|------|----------|
| Injeksjonsvæske | Follitropin beta: 300 IE | 0.36 ml | C | | 1 035,20 |

Rekovele Ferring Pharmaceuticals A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|------------------------------|---------|-------|------|----------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin delta: 12 mikrog | 0.36 ml | C | | 1 150,10 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin delta: 36 mikrog | 1.08 ml | C | | 3 377,80 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin delta: 72 mikrog | 2.16 ml | C | | 6 719,30 |

L14.4.1.2. Lutropin og koriongonadotropin

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 28.11.2017

Egenskaper

Lutropin er rekombinant, luteiniserende hormon (LH), som i et FSH-stimulert ovarium gir videre modning av egget og ovulasjon. LH stimulerer også progesteronsyntese i ovariene og testosteronsyntese i testiklene. Koriongonadotropin (HCG) har overveiende en LH-effekt.

Farmakokinetikk

- *Lutropin*: Biotilgjengeligheten er 56 % ved subkutan tilførsel. Utskilles via nyrene, mindre enn 5 % umetabolisert. Halveringstiden er 11–18 timer.
- *Koriongonadotropin*: Biotilgjengeligheten er ca. 40 % ved subkutan tilførsel. Metaboliseres og utskilles via nyrene, ca. 10 % umetabolisert. Halveringstiden er ca. 30 timer.

Indikasjoner

Lutropin og koriongonadotropin brukes i regimer for å indusere ovulasjon, fortrinnsvis i kombinasjon med FSH (follitropin). Koriongonadotropin brukes også hos menn ved hypogonadotrop hypogonadisme, kryptorchisme og infertilitet.

Dosering og administrasjon

Valg av regime og dosering er oppgave for spesialist.

Bivirkninger

Overstimulering av ovarier, cystedannelse, abdominalsmerter, kvalme, hodepine. Salt- og væskeretensjon og gynekomasti kan forekomme ved høy dosering av koriongonadotropin hos menn (som følge av høye androgennivåer).

Kontroll og oppfølging

Spesialistoppgave.

Informasjon til pasient

Økt risiko for flerlingsvangerskap.

Brevactid Ferring

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|-----------------------------|--------|-------|------|------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Koriongonadotropin: 5000 IE | 1 Sett | C | | – |

Choriomon IBSA Instut Biochimique SA

Godkjenningssfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|-----------------------------|--------|-------|------|------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Koriongonadotropin: 5000 IE | 3 Sett | C | | – |

Gonasi Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking!

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|-----------------------------|--------|-------|------|--------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Koriongonadotropin: 5000 IE | 1 Sett | C | | 283,70 |

Ovitrelle Merck

Godkjenningssfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-------|------|------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Koriongonadotropin alfa: 250 mikrog | 0.5 ml | C | | – |

Ovitrelle 2care4 ApS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-------|------|-------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Koriongonadotropin alfa: 250 mikrog | 0.5 ml | C | | 457,- |

Ovitrelle Merck Europe B.V.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-------|------|-------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Koriongonadotropin alfa: 250 mikrog | 0.5 ml | C | | 457,- |

L14.4.1.3. Follitropin og lutropin

Publisert: 28.09.2016
Sist endret: 24.5.2018**Se også**[Follitropin og urofollitropin](#)[Lutropin og koriongonadotropin](#)**Egenskaper**

Follitropin er syntetisk, rekombinant, follikkelstimulerende hormon (FSH). Det har prinsipielt samme effekt som det fysiologiske FSH, dvs. induserer follikkelvekst og østrogenproduksjon i ovariet og stimulerer testiklenes spermatogenese. Tre former av follitropin er markedsført, follitropin alfa, beta og delta. (De skiller seg fra hverandre bare ved små ulikheter i karbohydratkjeden i glykoproteinet og renseprosedyren etter syntesen.) Delta gir høyere eksponering enn alfa.

Lutropin er rekombinant, luteiniserende hormon (LH), som i et FSH-stimulert ovarium gir videre modning av egget og ovulasjon. LH stimulerer også progesteronsyntese i ovariene og testosteronsyntese i testiklene.

Farmakokinetikk

- *Follitropin alfa*: Biotilgjengeligheten er ca. 70 % ved både intramuskulær og subkutan tilførsel. Data for metabolisme savnes. Utskilles via nyrene, ca. 10 %. Halveringstiden etter enkel dose gitt intravenøst er 18 timer, gitt subkutan 37 timer.

- *Follitropin beta*: Biotilgjengeligheten er ca. 77 % ved både intramuskulær og subkutan tilførsel. Biokjemisk svært likt humant urinbasert FSH og metaboliseres og utskilles på samme måte. Halveringstiden er 27–44 timer.
- *Follitropin delta*: Biotilgjengeligheten er ca. 64 %. Terminal halveringstid er 40 timer etter enkel og 28 timer etter gjentatt subkutan administrering. Antas å utskilles som andre follitropiner, dvs. hovedsakelig via nyrene.
- *Lutropin*: Biotilgjengeligheten er 56 % ved subkutan tilførsel. Utskilles via nyrene, mindre enn 5 % umetabolisert. Halveringstiden er 11–18 timer.

Indikasjoner

Follitropin og lutropin er indisert til stimulering av follikkelutvikling hos voksne kvinner med uttalt LH- og FSH-mangel.

Dosering og administrasjon

Bør gis som en kur med daglige injeksjoner. Behandlingen bør tilpasses pasientens individuelle respons bedømt ved å måle follikkelstørrelse med ultralyd og østrogenrespons.

Pergoveris Merck Europe B.V.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|---|---------|-------|------|----------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 300 IE Lutropin alfa: 150 IE | 0.48 ml | C | | 1 653,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 450 IE Lutropin alfa: 225 IE | 0.72 ml | C | | 2 462,50 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Follitropin alfa: 900 IE Lutropin alfa: 450 IE | 1.44 ml | C | | 4 888,70 |

L14.4.1.4. Menotropin

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 05.01.2018

Egenskaper

Menotropin (= humant menopause-gonadotropin, HMG) er ekstrahert og høyrenset fra human urin. Inneholder både FSH- og LH-aktivitet. Humant koriogonadotropin (HCG) er et naturlig forekommende hormon i postmenopausal urin og er hovedbidragsyter til LH-aktiviteten. Menotropin induserer follikkelvekst og -utvikling samt gonadal steroidproduksjon.

Farmakokinetikk

Data for biotilgjengelighet savnes. Metaboliseres i og utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden for FSH er ca. 30 timer.

Indikasjoner

Hormonell ovariestimulering som ledd i behandlingsprogrammer for assistert fertilisering.

Dosering og administrasjon

Tilføres subkutan (alle styrker) eller intramuskulært (75 IE og 150 IE).

Valg av regime og dosering er oppgave for spesialist.

Bivirkninger

Vanligst er overstimulering av ovariene, bekkensmerter, abdominalsmerter, abdominal distensjon, kvalme, forstørret abdomen, hodepine. Cystedannelse forekommer.

Kontroll og oppfølging

Utføres av spesialist.

Informasjon til pasient

Økt sjanse for flerlingsvangerskap.

Menopur Ferring Legemidler AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|---------------------|--------|-------|------|----------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Menotropin: 600 IU | 1 stk | C | | 2 310,70 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Menotropin: 1200 IU | 1 stk | C | | 4 604,30 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Menotropin: 600 IU | 1 Sett | C | | 2 143,50 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Menotropin: 1200 IU | 1 Sett | C | | 4 269,80 |

Meriofert IBSA Farmaceutici

Godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|--------------------|---------|-------|------|------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Menotropin: 150 IE | 10 Sett | C | | – |

Meriofert Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|--------------------|---------|-------|------|----------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Menotropin: 75 IE | 1 Sett | C | | 225,30 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Menotropin: 150 IE | 1 Sett | C | | 436,30 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Menotropin: 150 IE | 10 Sett | C | | 4 037,30 |

L14.4.1.5. Korifollitropin alfa

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 09.01.2017

Egenskaper

Langtidsvirkende follikkelstimulerende substans med samme farmakodynamiske profil som rekombinant FSH, men med utpreget forlenget varighet av FSH-aktivitet.

Farmakokinetikk

Tilføres subkutan som en enkeltdose. Biotilgjengelighet er ca. 60 %. Utskilles primært via nyrene. Halveringstid ca. 70 timer.

Indikasjoner

Hormonell ovariestimulering i kombinasjon med en GnRH-antagonist som ledd i behandlingsprogrammer for assistert fertilisering.

Dosering og administrasjon

Valg av regime og dosering er en oppgave for spesialist i infertilitetsbehandling.

Bivirkninger

Overstimulering av ovarier, cystedannelse, abdominalsmerter, kvalme og hodepine.

Kontroll og oppfølging

Utføres av spesialist.

Elonva Orifarm AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. Ref. | Pris |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|------------|----------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Korifollitropin alfa: 150 mikrog | 0.5 ml | C | 8 091,50 |

L14.4.2. Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon

Publisert: 13.09.2016

Egenskaper

Syntetiske peptidanaloger av gonadotropin frigjøringshormonet GnRH (LHRH). Preparatene faller i to hovedgrupper:

- Den første gruppen *GnRH-agonistanaloger* (buserelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin, triptorelin) er mange ganger mer potente enn det naturlige gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH). Disse midlene gir forbigående en overstimulering ved hypofysens frisetting av LH og FSH som etter noen dager følges av en vedvarende nedregulering med redusert gonadotropinnivå i blodet. Dette leder til en kortvarig stigning i nivået av androgener og østrogener, etterfulgt av et sterkt fall. Det er denne reduksjonen i hormonnivå (kjemisk kastrasjon) man tilsikter i behandlingen av hormonfølsomme svulster.
- Andre *GnRH-antagonistanaloger* (cetorelix, degarelix, ganirelix) er rene antagonister som hemmer gonadotropinutskillelsen uten innledende stimulering.

Indikasjoner

Se også de enkelte midlene da de har ulike bruksområder. Generelt:

- Cancer prostatae (agonistanaloger brukes hvis det ikke er behov for umiddelbar kastrasjonseffekt, som f.eks. ved truende tverrsnittslesjon der antagonistanaloger (antiandrogener) må benyttes).
- Cancer mammae (klinisk respons ser ut til å være omtrent som ved annen endokrin behandling av disse tilstandene)
- Endometriose, symptomatisk behandling
- Forbehandling ved assistert befruktning
- Pubertas praecox
- Diagnostisk ved hypofysesvikt

Dosering og administrasjon

Se de enkelte stoffene og spesiallitteratur.

Bivirkninger

- Hos *kvinner*: Østrogenbortfallssymptomer som hetetokter, tørre vaginalslimhinner, redusert libido, brystspreg, økt mineraltap fra skjelett.
- Hos *menn* sees symptomer på androgenmangel med hetetokter, tretthet, impotens, nedsatt libido samt anemi og osteoporose. Kardiovaskulær sykdom, inkludert QT-forlengelse og tromboemboli er mulige bivirkninger av behandlingen.
I den initiale fasen (1–2 uker) kan det med GnRH-agonister komme forverring av symptomer (skjelettsmerter, vannlatningsbesvær). Ved prostatakreft kan disse symptomene, forårsaket av den tidlige forbigående økningen i serum-testosteron, lindres ved behandling med antiandrogen (se [Antiandrogener til onkologisk bruk \(L3.10.1\)](#)). Hos kvinner kan det komme blødning og mastalgi.

Irritasjon av neselshinnen ved bruk av neseppray. Hudutslett.

Graviditet, amming

Graviditet: Kontraindisert ved graviditet. Ved agonisteksponering i de første ukene av svangerskapet synes det ikke å være økt risiko for misdannelser eller abort, men dette spørsmålet er ikke endelig avklart. *Amming*: Overgang til morsmelk er minimal pga. høy molekylvekt. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring.

Kontraindikasjoner

Graviditet.

Forsiktighetsregler

Metastaser med urinveisobstruksjon eller truende tverrsnittslasjon. *Ved endometriosebehandling med GnRH-agonister:* Behandlingen bør ikke strekke seg utover 6 måneder pga. økt osteoporoserisiko. Skal behandling vare utover 6 måneder, gis lavdose østrogen/gestagen eller tibolon i tillegg for å hindre beintap og for å lindre østrogenbortfallssymptomer. Slik «add-back behandling» reduserer ikke effekt av behandling ved endometriose.

Kontroll

Østradiol- og testosteronnivå i serum.

Kilder

[Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

L14.4.2.1. Buserelin

Publisert: 13.09.2016

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner** og **kontroll**, se [Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Egenskaper

GnRH-agonistanalog som hemmer frigjøring av FSH og LH etter initial stimulering. Brukes som neseppray.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 2–4 % ved intranasal tilførsel. Metaboliseres i lever og nyrer via peptidaser til inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 1–2 timer.

Indikasjoner

Forbehandling ved assistert befruktning.

Dosering og administrasjon

Neseppray: 2 doser 6 ganger daglig.

Overdosering

Se [G \(G12.5.7\)](#).

Kilder

[Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Suprecur Sanofi-aventis Norge (3)

| Form | Virkestoff/styrke | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------|--------------------|-------------|------|----------|
| Neseppray | Buserelin: 0.15 mg | 2×100 doser | C | 1 144,60 |

L14.4.2.2. Goserelin

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 22.03.2017

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner** og **kontroll**, se [Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Egenskaper

GnRH-agonistanalog. Hemmer frigjøring av FSH og LH etter initial forbigående stimulering. Brukes som implantat subkutant i abdominalveggen. Frisettingen fra implantatet er jevn, maksimale verdier etter ca. 2 uker. Deretter jevnt synkende.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 100 %. Data om metabolisme savnes. Utskilles hovedsakelig via nyrene, delvis metabolisert. Halveringstiden er 2–4 timer.

Indikasjoner

- Endometriose
- Cancer prostatae
- Cancer mammae

Dosering og administrasjon

En implantasjonsinjeksjon subkutan hver måned eller hver 3. måned.

Overdosering

Se [G \(G12.5.7\)](#).

Kilder

[Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Zoladex Abacus Medicine A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------|-------------------|-------|-------|------|----------|
| Implantat | Goserelin: 3.6 mg | 1 stk | C | b | 1 439,60 |

Zoladex AstraZeneca

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------|--------------------|---------|-------|------|----------|
| Implantat | Goserelin: 3.6 mg | 3×1 stk | C | b | 4 246,20 |
| Implantat | Goserelin: 3.6 mg | 1 stk | C | b | 1 439,60 |
| Implantat | Goserelin: 10.8 mg | 1 stk | C | b | 3 986,10 |

L14.4.2.3. Leuprorelin

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 24.05.2018

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Egenskaper

GnRH-agonistanalog. Hemmer frigjøring av FSH og LH etter initial forbigående stimulering. Brukes som depotinjeksjon subkutan. Maksimal serumkonsentrasjon oppnås etter ca. 3 timer. Avtar deretter for å nå likevekt etter 3–7 dager.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er > 90 % ved subkutan tilførsel. Metaboliseres ved enzymatisk nedbrytning. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er ca. 3 timer.

Indikasjoner

- Cancer prostatae
- Endometriose

Dosering og administrasjon

Implantat/depotdose injiseres subkutan med følgende intervaller: *Prostatacancer*: 7,5 mg (Eligard), 3,75 mg (Enanton Depot Set, Procren Depot) eller 3,6 mg (Leuprorelin «Sandoz») gis hver 4. uke. 22,5 mg (Eligard), 11,25 mg (Enanton Depot Set, Procren Depot) eller 5 mg (Leuprorelin «Sandoz») gis hver 3. måned. 45 mg (Eligard) eller 30 mg (Enanton Depot Set, Procren Depot) gis hver 6. måned. Behandlingen er langsiktig og skal ikke avbrytes ved remisjon eller bedring av tilstanden. *Endometriose*: 3,75 mg hver 4. uke eller 11,25 mg hver 3. måned (Enanton Depot Set, Procren Depot). Administrering bør initieres 1.–5. dag i menstruasjonssyklus. Anbefalt behandlingstid er 6 måneder.

Overdosering

Se [G \(G12.5.7\)](#).

Bivirkninger

Se gruppeomtale i [Bivirkninger](#). I tillegg lokal irritasjon på injeksjonssted; varier injeksjonsstedet.

Forsiktighetsregler

Det er sendt ut eget [Kjære helsepersonell-brev](#) (2014) om risiko for ukorrekt tilberedning og administrering (Eligard).

Det er sendt ut eget [Kjære helsepersonell-brev](#) (2017) om fare for sprekkdannelse, lekkasje og medisineringsfeil dersom sikkerhetskanylen skrur for hardt på (Eligard).

Kilder

[Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Eligard Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|----------------------|--------|-------|------|----------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Leuprorelin: 22.5 mg | 1 Sett | C | b | 3 460,40 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Leuprorelin: 45 mg | 1 Sett | C | b | 6 473,30 |

Eligard 2care4 ApS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|----------------------|--------|-------|------|----------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Leuprorelin: 22.5 mg | 1 Sett | C | b | 3 460,40 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Leuprorelin: 45 mg | 1 Sett | C | b | 6 473,30 |

Eligard Orifarm AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|----------------------|--------|-------|------|----------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Leuprorelin: 22.5 mg | 1 Sett | C | b | 3 460,40 |

Enanton Depot Dual Orion Corporation - Espoo

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|-----------------------|----------|-------|------|----------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Leuprorelin: 11.25 mg | 11.25 mg | C | b | 3 512,20 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Leuprorelin: 30 mg | 30 mg | C | b | 6 423,40 |

Leuprorelin Sandoz Sandoz - København

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------|-------------------|-------|-------|------|----------|
| Implantat | Leuprorelin: 5 mg | 1 stk | C | b | 2 603,20 |

Procren Depot AbbVie AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|------|----------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske | Leuprorelin: 3.75 mg | 3×3.75 mg | C | b | 4 113,90 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske | Leuprorelin: 3.75 mg | 3.75 mg | C | b | 1 395,50 |
| Pulver og væske til injeksjonsvæske | Leuprorelin: 11.25 mg | 11.25 mg | C | b | 3 634,10 |

L14.4.2.4. Nafarelin

Publisert: 13.09.2016

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Egenskaper

GnRH-agonistanalog. Hemmer frigjøring av FSH og LH etter initial forbigående stimulering. Brukes som nesep spray. Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås innen 20 minutter. Ev. rhinitt hemmer ikke absorpsjonen.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 1,5–5 % ved intranasal tilførsel. Metaboliseres til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, ca. 6 % umetabolisert, og i feces i like store mengder. Halveringstiden er ca. 4 timer.

Indikasjoner

- Endometriose
- Forbehandling ved assistert befruktning

Dosering og administrasjon

Spray: 200 µg × 2 (i hvert sitt nesebor) i inntil 6 måneder. Behandlingen bør starte på menstruasjonens 1.–4. dag. Ev. bruk av slimhinneavsvellende nesedråper bør skje minst 30 minutter etter nafarelin. Om nysing oppstår under administreringen bør dosen gjentas.

Kilder

[Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Synarel Pfizer

Godkjenningfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-------------------------|-------------------|------|-------|------|------|
| Nesep spray, oppløsning | Nafarelin: 2 mg | 8 ml | C | | – |

Synarela Pfizer AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-------------------------|-----------------------|----------|-------|------|--------|
| Nesep spray, oppløsning | Nafarelin: 200 mikrog | 60 doser | C | b | 925,50 |

L14.4.2.5. Triptorelin

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 11.01.2018

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Egenskaper

GnRH-agonistanalog. Hemmer frigjøring av FSH og LH etter initial forbigående stimulering. Brukes subkutan til nedregulering i fertilitetsbehandling eller som depotinjeksjon intramuskulært til behandling av prostatakreft eller kastrasjonsbehandling. Ved subkutan injeksjon skjer en triptorelinindusert nedregulering av hypofysen som kan forhindre prematur stigning ("surge") av LH og derved prematur ovulasjon og/eller follikkulær luteinisering. Nedregulering reduserer hyppigheten av syklus kanselleringer og forbedrer graviditetsraten. Ved depotinjeksjon skjer en sakte frisetting av triptorelin ved nedbrytning av preparatets mikrokapsler. Maksimal serumkonsentrasjon oppnås i løpet av få timer. Deretter en trappevis reduksjon over ca. 40 dager.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 100 % ved subkutan eller intramuskulær tilførsel, fra intramuskulært depot 38,3 % de første 13 dagene, deretter gjennomsnittlig 0,92 % per dag. Metaboliseres i leveren og nyrene til inaktive peptider og aminosyrer. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 3–5 timer.

Indikasjoner

Til subkutan injeksjon hos kvinner i forbindelse med assistert fertilitetsbehandling (*Gonapeptyl*). Avansert prostatakreft (*Pamorelin*). Reversibel, medikamentell kastrasjon av voksne menn for å redusere kjønnsdriften (*Salvapar*).

Dosering og administrasjon

Gonapeptyl: se spesiallitteratur. *Pamorelin*, *Salvapar*: 11,25 mg intramuskulært hver 3. måned. Injeksjonsstedet bør varieres.

Overdosering

Se [G \(G12.5.7\)](#).

Kilder

[Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Gonapeptyl Ferring Legemidler AS

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|---------------------|--------|-------|------|--------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Triptorelin: 0.1 mg | 7×1 ml | C | | 554,50 |

Pamorelin Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--|-----------------------|--------|-------|------|----------|
| Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon | Triptorelin: 3.75 mg | 1 Sett | C | b | 1 190,10 |
| Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon | Triptorelin: 11.25 mg | 1 Sett | C | b | 2 977,70 |
| Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon | Triptorelin: 22.5 mg | 1 Sett | C | b | 5 759,70 |

L14.4.2.6. Cetrorelix

Publisert: 13.09.2016

Se også

Vedrørende **bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll**, se [Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Egenskaper

Ren GnRH-antagonistanalog. Hemmer frigjøring av LH og FSH fra hypofysen uten initial stimulering. Forsinker ovulasjon.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 85 % ved subkutan tilførsel. Data for metabolisme savnes. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er terminalt ca. 30 timer.

Indikasjoner

Forebygging av prematur ovulasjon hos pasienter som gjennomgår en kontrollert ovarial stimulering før eggthenting i forbindelse med assistert befruktning. Se spesiallitteratur.

Dosering og administrasjon

Cetrorelix må forskrives av spesialist som har erfaring med behandling av infertilitet.

Kilder

[Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Cetrotide Merck Serono Europe Ltd

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---|----------------------|--------|-------|------|--------|
| Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning | Cetroreliks: 0.25 mg | 1 Sett | C | | 425,40 |

L14.4.2.7. Ganirelix

Publisert: 13.09.2016
Sist endret: 20.10.2017

Egenskaper

Ren GnRH-antagonistanalog. Hemmer frigjøring av FSH og LH uten initial stimulering. Hemmer ovulasjon.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 90 % ved subkutan tilførsel. Metaboliseres i noen grad ved enzymatisk hydrolyse. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er ca. 13 timer.

Indikasjoner

Forebygging av prematur ovulasjon hos kvinner som gjennomgår en kontrollert ovarialstimulering i forbindelse med assistert befruktning. Se spesiallitteratur.

Dosering og administrasjon

Ganirelix må forskrives av spesialist som har erfaring med behandling av infertilitet.

Kilder

[Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon](#)

Fyremadel Sun Pharmaceutical - Nederland

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|---------------------|----------|-------|------|---------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Ganireliks: 0.25 mg | 0.5 ml | C | | 360,20 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Ganireliks: 0.25 mg | 5×0.5 ml | C | | 1 656,- |

Ganirelix Gedeon Richter Gedeon Richter Plc

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|---------------------|----------|-------|------|----------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Ganireliks: 0.25 mg | 6×0.5 ml | C | | 1 979,90 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Ganireliks: 0.25 mg | 0.5 ml | C | | 360,20 |

Ganirelix Orifarm Orifarm Generics A/S

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|-----------------------------|---------------------|----------|-------|------|---------|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Ganireliks: 0.25 mg | 0.5 ml | C | | 360,20 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Ganireliks: 0.25 mg | 5×0.5 ml | C | | 1 656,- |

L14.5. Hemmer av gonadotropinfrigjøring

Publisert: 13.09.2016

L14.5.1. Danazol

Publisert: 13.09.2016

Egenskaper

Syntetisk etisteronderivat med svak androgen effekt kombinert med antiøstrogen og antiprogesteron effekt. Hemmer frigjøring av gonadotropiner fra hypofysen. Pasienten får anovulasjon og amenoré. Stoffet har betydelige bivirkninger.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er god ved peroralt inntak og øker ved samtidig inntak av mat. Metaboliseres i stor grad i leveren. Metabolittenes aktivitet er ikke klarlagt. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 3–6 timer.

Indikasjoner

Endometriose.

Dosering og administrasjon

Individuell. 400–800 mg/døgn fordelt på 2–4 doser avhengig av effekt og bivirkninger. Behandlingen startes under menstruasjon og bør vedvare i minst fem måneder.

Overdosering

Se [D \(G12.5.4\)](#)

Bivirkninger

Østrogenbortfallssymptomer som ved menopause. Androgene effekter som akne, hirsutisme, stemmeforandring. Insulinresistens. Hodepine, kvalme, svimmelhet, utslett i hud, muskelpasmer. Levkopeni, trombocytopeni, kolestatisk ikterus (sjelden).

Graviditet og amming

Graviditet: Kan føre til virilisering av jentefostre. *Amming:* Bør unngås av ammende. Mulig androgen effekt på barnet.

Forsiktighetsregler

Hjerte-, lever- og nyrefunksjonsforstyrrelser. Høy alder. Epilepsi, migrene, diabetes mellitus, hypertensjon, hyperlipidemi, tidligere venøs tromboembolisme.

Kontraindikasjoner

Graviditet, amming. Alvorlig lever-, hjerte- eller nyrefunksjonssvikt. Tromboembolisk sykdom. Udiagnostisert vaginalblødning. Porfyri. Osteoporoserisiko.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se [Farmakologiportalen](#).

Danotrol Sanofi-aventis

Godkjenningssfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|--------------|-------------------|---------|-------|------|------|
| Kapsel, hard | Danazol: 100 mg | 100 stk | C | | – |

Danazol polfarmex Polfarmex

Godkjenningssfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek.

| Form | Virkestoff/styrke | | R.gr. | Ref. | Pris |
|---------|-------------------|---------|-------|------|------|
| Tablett | Danazol: 200 mg | 100 stk | C | | – |

L14.6. Kilder, legemidler i gynekologien

Kvinnelige kjønnshormoner/ Noretisteron

Mansour D. Safer prescribing of therapeutic norethisterone for women at risk of venous thromboembolism. J Fam Plann Reprod Health Care. 2012 Jul;38(3):148-9. Epub 2012 Jun 12.

Hale GE, Shufelt CL. Hormone therapy in menopause: An update on cardiovascular disease considerations. Trends in Cardiovasc Med. (25) 2015: 540-549.

Stevenson JC, Panay N, Pexman-Fieth C. Oral estradiol and dydrogesterone combination therapy in postmenopausal women: Review of efficacy and safety. Maturitas (76) 2013: 10-21.

Antikonsepsjonsmidler

Archer DF. Menstrual-cycle-related symptoms: a review of the rationale for continuous use of oral contraceptives. Contraception. 2006; 74: 359-66.

Sulak PJ, Kuehl TJ, Coffee A, Willis S. Prospective analysis of occurrence and management of breakthrough bleeding during an extended oral contraceptive regimen. Am J Obstet Gynecol. 2006; 195: 935-41.

Lello S. Nomegestrol acetate: clinical pharmacology. Drugs. 2010 Mar 26;70(5):541-59. doi: 10.2165/11532130-000000000-00000.

Wright KP, Johnson JV. Evaluation of extended and continuous use oral contraceptives. Ther Clin Risk Manag. 2008;4:905-11

Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon

Forlengt QT-tid og venøse tromboser som mulig bivirkning av anti-androgener, utredning fra RELIS 2012